


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2550/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2550/A




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2550/A




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2550/A

2550/A

A XVIII 0 1





Georgij multo.

86664

CLAVDII

W. Lam bard?

GALENI PER-
GAMENI DE AR-

1588

*te curativa ad Glaucenem,
Libri duo.*

Nicolao Leoniceno Vincen-
tino interprete.

*Quibus accesserunt accuratissime ani-
maduersiones ex veneto exem-
plari excerptæ.*

REM MAXIMAM SIBI




PROMITTIT PRUDENTIA.

LVGDVNI,

*Apud Gulielmum Rouillium,
Sub scuto Veneto.*

1549.





GALENI DE

ARTE CVRATIVA

AD GLAVCONEM

LIBER I.

NICOLAO LEONI-

ceno interprete.

CAP. I.



Vod quidē nō cōmunem tantū omniū hominū naturā medicū cognoscere oporteat, ô Glauco, sed & vniuscuiusq; propriā, & dudū ab Hippoc. rectē traditū est, & nos in ipsīs artis operibus (vt nosti) circa id sufficienter studuimus. Non tamen propriā singulorū naturā æquē atq; cōmunē possibilē est scribere. Verū scripta cōtrario modo se operibus habent, tum in plurib⁹ aliis rebus, tū præsertim in his quæ ad præsentē pertinent intētionem. Petiisti enim à nobis, vt tibi vniuersalē quādam mēdēdi viā ac rationē, quā per figurā ostenderemus: hæc autē & qualitate & quātitate singulorū medicaminū perficitur: necnō & modo eorū vsus, & ex tēporis occasiōe quæ

A 2

præ omnibus est cognitu difficillima: circa
quam præcipitem admodum existentem
(quemadmodum quodam in loco scribit
omnium bonorum nobis autor Hippocr.)
vides plerunque medicos non modò vul-
gares, sed & præcellentes aberrare. Quod
verò magni etiam momenti sit, si quãtitas
opportunè pro viribus accommodetur, idẽ
vir pariter scripsit. Quum igitur ad rectè
medendum plurimum conferre, & tempo-
ris occasio, & auxiliorum quantitas videat-

† *ἀπὸ τοῦ* tur, † insint autẽ hæc unicuique ægrotanti
ἐννύχιος propria, nihil autẽ proprium possit sermo-
ne explicari, hoc pacto quod commune est
*in Græ. *conamur transigere, quãvis id sit usu se-
ἐν νύκτι cundum. Nam & quosdã aliquando ægro-
ῶντες tos visimus, cum quibus dum sani essent nõ
ῥητέον eramur versati. Quo fit ut neq; quẽ colorẽ
ἰ. scribere quam habitudinẽ, aut nativũ calorem, aut
ῥητέον quem arteriarũ pulsum à natura habuerint
ῥητέον agnoscamus: quæ si sciremus, magnitudinẽ
morbis satis aliquando iudicare possemus.
Nam quantum vnumquodque à naturali
statu recedit, ad tantam morbus magnitu-
dinem peruenit: quantumcunque verò rece-
dit: possibile est scire ei qui naturalem sta-
tum exquisitè cognoverit. Quũ igitur hoc
in ipsis nobis fuerit ignotũ, ne omnino hæc
[hæc non] sitemus ad cõmune confugimus. [quamvis
ad

ad vsum secundum locum obtineat]. Hic *habentur*
 verò artifex plus aliquid quàm hi qui arte *in græco*
 carent assequitur. Quod verò hoc ipsum *exemplari.*
 plus sit, primus omnium quos nouimus, &
 hoc memorauit Hipp. Plenius autē de hoc
 scripserunt qui Hippocr. fuere posteri ores
 atque illius scripta accuratè legerunt. Ex
 quorū numero vnus fuit Mnesitheus Athe
 niensis, vir tum in aliis omnibus quæ ad
 artem pertinent sufficiēter doctus, tū verò
 qua via ac ratione, medendi scientiam opor
 teat exercere nemini peritia secundus. Hic
 igitur Mnesitheus à primis atque supremis
 incipiēs generibus; putauit secari illa opor
 tere in alia genera speciesq; ac differentias:
 hæc rursus in alia diuidi, ac denuo ista eodē
 modo, donec ad talē peruenerimus speciē
 post cuius diuisionem ad vnum numero &
 indiuiduum peruenerimus. Mihi verò qui ad
 te scribam, sufficit breuib; meā explicasse
 sententiam. Nam ridiculus videri possem,
 si tua te velim docere, tanquam non multo
 antea à Platone illa didiceris. Neque enim
 vt te docerem quam viam ac rationem in
 in diuisionibus sectari oporteat, hæc volui
 meminisse. Sed quoniam mihi ad sequētia
 omnia plurimum conducere existimaui, &
 quū à me exigeres ediscere causam ob quā
 medicorum plurimis oberrare contingit,

non aliter tibi ostendere poteram. Etenim quæ in aliis institutionibus cōtingūt errata, & quæ medici nūc in agrotātū curatione delinquūt, hāc primā atq; præcipuā causam habent, diuisionis scilicet prauitatem. Quidā autē in primis & supremis generibus stant: indicationibus solū quæ ab illis sumuntur, cōtenti quidā verò vsq; ad aliquid diuidūt, non tamē vsq; ad finē perueniunt: nonnulli verò etiā vitiosis vtuntur diuisionibus. Qui verò & omnia quæ sunt secundū naturā & præter naturā hoc diuisionis artificio cōplectitur, atq; ab his omnibus quæ sufficiēter diuisa sunt, sumit indicationes: hic solus quantū humanis permittitur viribus medēdo non errabit. Illos quidē quorū habet notitiā, melius curabit quā alios, ignotos verò proximē illis quoad fieri poterit ad sanitatē perducet. Si quis enim primūm distinxerit eam quæ secundū ætates differentiā postea eam quæ secundū temperaturas atq; potētias, & ceterā quæ hominibus insunt, colores dico, atq; calores, habitudinesque, & pulsuū motus, & assuetudines, ac industrias, atq; animi mores, his quoque adiunxerit eam quæ maris à fœmina differentiam, & quæcūque ad regiones & temporum pertinent status, aliasque
† In ant. tates
reſponſe eius qui nobis circumfunditur aëris

tates recto modo cōsiderauerit hic ad pro- *id est tem-*
 priam laborātis naturam agnoscendā pro- *peries.*
 ximè accedet. Sed ex his omnibus nōnulla
 quidem in libris de pulsibus, nōnulla verò
 in his in quibus agitur de tēperaturis sunt
 determinata: sicuti quæ præter naturā sunt,
 vniuersa quomodo inter se & speciebus &
 generibus differāt, in libro de passionibus
 est præfinitū. Nunc verò de his solū ægro-
 tis dicere proposuimus, quorum natura, an-
 tequàm morbum contraherent, nobis erat
 exquisitè perspecta. Cum quibus tamen &
 reliqui omnes intelligentur qui nobis erāt
 ignoti. Nihil enim difficile, ab eo quod est
 perfectè distinctū, id quod nō sit tale inue-
 nire. *De febribus ephemeris. CAP. II.*

Initū igitur sumemus à febribus, quo-
 niam tu in his præcipuè curandi artifi-
 cium habere cupiebas. Et primū quidem
 de his sermonem habeamus quæ simplicis-
 simæ sunt, quas Hippocrates ephemeris ** In ant.*
 appellat. Hæ verò sunt quæ propter lassitudinem *legitur*
 eneniunt, & ebrietates, atque iras, *in report.*
 furores, atque mœrores, atque aliās animi *pag. i. ve-*
 curas ** assiduas,* & quæ ex inguinum inflā- *hementio-*
 tionibus febres ortū habent, ex hoc ge- *res in im-*
 nere sunt, præterquā si absq; vlcere siāt ma- *pres. cum-*
 nifestò: tūc enim suspicionē afferūt, & nullo *τίος. i. ve-*
 modò mites sunt. Vigiliæ plerūq; simplicē *hementes.*

In ant. co
dice addi-
tur τὸ τω
i. hoc pa-
sto.

febrem induxerunt, sicuti frige factio &
 exustio quandoque. Atque hæ omnes fe-
 bres* soluuntur facillimè. Oportet siquidẽ
 eos confestim ducere ad balnea, atque ad
 aliam consuetam victus rationem. Quan-
 doquidem qui pertritum illum sermonem
 medicorum triduanum terminũ expectant
 sapius acriores febres effecerunt, quamuis
 & aliter præter ea delinquant, quemadmo-
 dum cernis ex eis plures, in primo ingressu
 delinquẽtes, veluti re vera manufactas fa-
 cere ægri tudines. Sed cura quidem harum
 febrium in promptu est: at earum cognitio
 maiorem exigit diligentiam: de qua nemo
 antè nos quantum oportuerit scriptum re-
 liquit. Quare minus mirandum complures
 tantum in medicinæ operibus aberrare,
 quantum etiam cognitione falluntur. Sæ-
 pius enim quidã casu aliquo in graues mor-
 bos incidũt, veluti vino pleni, aut sole exu-
 sti, aut frigore enecti, aut lassitudine op-
 pressi, aut vigilias passi, aut ira perciti, aut
 quauis alia causa, quæ per se nocere natura
 fit apta, correpti: deinde totum in causa an-
 tecedente consistere, neque aliã subesse di-
 spositionẽ arbitrati, circa victum negligẽ-
 tius se habent, adeo vt seipso lateant in in-
 sanabiles aut ægrè curationẽ admittentes
 morbos prolabi. Hæc igitur præcipuè sunt
 animaduer

animaduertenda, quemadmodū Hipp. admonet: non solum futura præcognoscere, sed præterita etiam atq; præsentia. Nam & quod nūc pponitur, ad eā artis attinet partē: quod pro viribus manifestè trademus. Neque enim parua est differentia, si laueris iam ægrotantem & securū esse iusseris, aut eum per omnē custodiam securitatemque traduxeris. Quum igitur ad ægrum accedes, primū à maximis quæ circa ipsum sunt consideratio incipienda, deinde & ab aliis, adeo ut nec minimum aliquod omittamus. Nam ut magis aut minus ei quæ fit ex maximis indicatione credamus, ex aliorum fit adiunctione. Maxima quidem in omnibus febricitatibus signa, in pulsibus atque urinis consistunt: his verò addere oportet & quæcunque alia circa faciem Hippo. scribit accubitum quoque & respirationē, item ea quæ ab ore excernuntur, atque alui sedimina. Et si quid aliud accidere circa aliquam corporis partem, aut operationē consistere videas (qualia ille mille in millibus scripsit) neque ex his vllum aliquod negligenter prætereas: hæc quidem omnibus febribus communia sunt. Itaque in his simplicissimis, de quibus præsens est sermo, nihil horum relinquere oportet. At postquam ex *In cod.* pulsibus atque urinis febris naturam per- *Ald. habe.*

tur hęc ceperis, quum pulsus nullum inflammatio-
i. morē in nis signum habuerit, neq; omnino inæqua-
veteri au litas in vna arteria cōpulsione apparue-
tem ei dōq rit, aut si hoc affuerit, omnino sit imbecille,
i. formā. vrinæ aut omnino similes his quæ secundū
 naturam se habent, aut non multum à natu-
 rali statu recesserunt: tunc & ad omnia illa
 quæ antea à nobis sunt dicta accedere oportet.
 Et quum veluti chorus quidam omnia
 concinnè loquūtur, tunc etiam fidere oportet,
 ac, si libeat, interrogare nunquid aliqua
 manifesta antecesserit causa. Si quid enim
 huiusmodi æger fateatur, expectata prima
 febris solutione, statim oportet lauare,
 quum tunc certior tibi sit facta cognitio,
 ex ipso solutionis modò. Nam arteriarum
 motus in hoc in totum assimilatur huic
 qui in sanis deprehenditur, quum in nulla
 alia febre ad naturalem habitum reuertatur,
 neque si multum temporis inter primæ
 accessionis finem, & secundæ principiū
 intercitat, quemadmodum in tertianis atque
 quartanis. In illis enim, febris remanet si-
 gnum in ephemeris autem in totum aboletur
 accessione cessante: plurimis verò earum,
 & humidi quidā vapores, & quibusdā
 etiam sudores vtilēs apparent: aut omnino
 quædā ceu vaporis copia ex intimo corporis
 exit. Verū vrinæ quoq; multò nūc meliores

liores, quā circa febris principia tibi videbuntur. Et si capitis aut alterius partis dolor simul inuaserit, neq; hic amplius persistet. Aegrotantis quoq; in tolerando facilitas: magnū & ipsa signum, tanquā sigillum quoddā super omnia alia signa, febris suauitatē tibi indicabit. Et si dū lauantur neq; horror aliquis insolitus molestauerit, neque alia tristitia affuerit. & si post balneum deinceps bene se habere perseueret, tunc ne verearis cibum offerre, vinū quoq; sine formidine ad potandum exhibe. adhibito tamen pro tempore modo nos autem, vt te nō latet, eis causam quæ antecesserit solemus prædicere, neque expectamus vt illam ægrotus anticipet enarrare, quod maximum est argumentum, illum non errare qui talē sit adeptus facultatem. Si verò remanentibus adhuc animi affectibus cōsideratio habeatur, tūc ex pulsibus maximē tentanda cognitio, quēadmodum in libris de pulsibus scripsimus. Post hos verò, & ab aliis cognitio petēda est. Quod si illa iam quidē cessauerint, remanet autē dispositio, paruū quidē ex pulsib⁹ habebis indicatiū earū quæ febrē attulerūt passionū, sufficient aut tibi & sine pulsib⁹ reliqua. Cōmuniter quidē, omnibus vrinæ rufæ. Adiūgitur verò his qui propter tristitiā febricitāt, acritudo

do potius quā abundātia caloris. quēadmo-
 dum ē diuerso, his qui propter furorē. Sed
 † In græ. & extenuatio corporis † in his quos tristi-
 ita legit tia & cura vexarunt cōspectior existit: ocu-
 επιδιδωσι lorū præterea cauitas, ac quædā inconsue-
 ρα τοῖς λυ ta decoloratio. Hæc quidem sunt & his qui
 πιθεῖσιν quouis modò aliter cogitarunt, cōmunia.
 φροντισα- maximè autē ex oculis distinguere oportet.
 et, id est Nā ex his etiam in sanis, animæ mores
 conspe- possumus coniectare. At in ægrotis si quis
 etior exi- diligenter inspicere queat: sunt indicia cer-
 stit in his tiora. Sic quidem eos, qui propter discipli-
 quos tri- nas aut contemplationem aliquam diu co-
 stitia quā gitarunt: ab his quos tristitia corripuit, di-
 in his quos scernere oportet. At qui vigilarint, distin-
 cura vexa guere oportet ex forma palloris. Nam in
 uit. ipsis facies subtumens, & oculorū † motus
 † Alij le- manifestus, vix enim palpebras attollunt.
 gunt mo- Inest etiam palbebris humiditas. Nam qui
 tus ligati tristantur aut cogitationibus detinentur,
 * Græ. his exiccantur. Cauitas est cōmune accidēs
 codi. ha- omnibus, mœrori, vigiliis, cogitationibus,
 bent τοῦ non tantē furori. * in hoc enim neq; oculo
 τωρ .i. in rum cauitas neq; pallor manifestus: & plus
 his. sed caloris atque celerius ex imò prorumpit,
 hæc est me neq; pulsuum magnitudo destruitur, quē-
 lior lectio admodum in vigiliis, tristitia & cogitatio-
 nibus. Quare hæc à furore apertissimè di-
 stinguuntur. ab inuicem verò quemadmo-
 dum

Et quidem pulsus non eodem in vtrisque modo se habet. quia parui quidem his sunt quos superfluus labor vexauit, in aliis verò magni. Quæ verò corpore condensato accidunt febres (condensatur autem aut ex frigore aut ex qualitate aliqua quæ vim astringendi habet, præter consuetudinem ei adueniente. velut illi qui aqua aluminosa se lauerat accidit) hæc quidem ex omnibus febribus solæ, sunt astricta passio. has verò tactu cognoscere licet, quemadmodum & ætæntes febres, & quæ ex laboribus & combustionibus fiunt. Nam neque harum densitas hos queat latere qui tactum habent exercitatum, sed & caloris motus nescio quo pacto regreditur. qui

mitis quidem in primo tactu sentitur, acris
autem, si plusculum tardemus. Non tamen
* *ἐν δὲ* & his urinae sunt ruffae, * neque corporis tu-
* *τὸ σώμα*-mor relabitur, neque etiam oculi caui atq;
* *τὰς ὄψεις* aridi fiunt, sed sunt quibus humecti magis
* *συνπι-* atque prominentes apparent, quam hi qui
* *πταχέρ* secundum naturam se habent. Neque sunt
* *ἢ* est neq; pulsus minores, quemadmodum in nicero-
corporis ribus, curis, aut vigiliis aut immodicis exer-
moles con- citiis.

cidit. De febribus quae fiunt ex inflammationi-

bus inguinum.

CAP. III.

FEbres quae ex inflammatione ingui-
num fiunt, pulsus habent maximos,
veloces, atque frequentes, plurimusque
illis calor inest, ac postquam febris con-
stitit, statim ex profundo quaedam emer-
git humiditas, calida quidem, sed mitis.
Acris etenim & mordax, huic generi fe-
brium inter omnia alia minimè adest. Atq;
in totum, facies rubicunda illis & magis tu-
* *† In anti.* mens, urinae quae * *λευκότε-* subalbidae. Communis
* *ρα. i. al-* autem omnibus huiusmodi febribus, est
* *biore.* pulsus æqualitas. Nam paucae admodum
ex his febribus eã quae in vno ictu inæqua-
litate ostendunt: at neq; ipsae satis aper-
te ac manifestè illam præ se ferunt. Talia
quidem sunt ipsarum indicia. Curare autē
oportet omnes quidem balneis. At qui ex
denſi

densitate cutis, aut inguinum inflammatio-
ne febricitant, si in aëre balnei immorari
iusseris, haudquaquam nocebis reliquos
omnes, quam citissimè oportet ab aëre se-
mouere, si verò diutius in aqua immorari
voluerint, permittere. oleo autem tepido,
& multò, & manibus mollibus perfricare
quamplurimum, atque hos praesertim qui
ex labore febricitant, secundo autem loco
qui meatus habent astrictos, & tertio qui
inflammationem inguinum patiuntur, sæ-
pius autè istos lavare in quantum possibile
est. Cibum autem assumere qui ex labore
febricitant possunt multoties, non æquè ta-
men qui ex densitate cutis, aut inguinis in-
flammatione laborant. At his utrisq; tenuis vi-
ctus est utilis. Qui verò ex laboribus fe-
brierint, præcipuum est ut cibos assumant
concoqui faciles ac cruditatem præcipuè
devitent, sed & vinum potare quantum
possunt convincere, sunt permittendi. Men-
suræ autè ratio, quæadmodum in aliis omni-
bus, ex viribus & ætate sumitur ægrotan-
tis, necnon & ex naturalitemperatura, &
præterea ex cōsuetudine, & anni tēpore, &
regiōe atq; aliis huiusmodi. Qui verò ex
inguinū inflammatione febricitant, arcendi
sunt à vini potu donec inflammatione solvā-
tur. At qui cutis formina habent astricta,
aut

aut refrigerati sunt, si quidem non multum
 hoc affectum laborent, neque plenum corpus
 habeant, non sunt à vini potu prohibendi. at
 qui supra modum refrigerati sunt aut ple-
 niore corpore, prohibere utile est. Qui ve-
 rò ex vigiliis aut aliquo animæ affectu fe-
 bricitant: postquam balneaveris, cibo humido
 ac boni succi reficere expedit. vinum verò
 omnibus his qui vigiliam passi sunt in tre-
 pidè offerre, nisi capitis dolore premantur,
 aut pulsus venarum in temporibus sentiant.
 Liquet autem quod etiā in aliis eadem est
 observatio adhibenda. Sed & iis qui ira aut
 mœrore aliquo, † aut cogitatione febricitant,
 vinum est exhibendum, & qui * fu-
 rore perciti fuerunt, quando omnino ab
 affectu quieverunt, prius verò periculosum
 vti vino. Tentare autem oportet & cōtra-
 rium semper afferre ei quod molestat, labo-
 ri quidem quietem. vigiliis verò somnum.
 iræ autem & furoriatque tristitiæ, sermo-
 nibus, actionibus, spectaculis, enarrationi-
 bus animi iocunditatem. Sic qui cogitatio-
 ne laborat, omnino ratiocinationes omit-
 tat. Et qui ex inguinū inflammatione febricitat,
 eius curationi intēdat, ac multò prius
 vlceris, unde originem habuit. Hæc qui-
 dem febrium ephemerarum indicia, atque
 remedia sufficiunt. Reliquæ verò febres
 nonnullæ

† Additur
 in anti. ἢ
 ἀρεσυνῶ-
 σασι. i.
 aut vigi-
 lia.
 * τοῖς θυ-
 μασι.

nonnullæ ex inflammationibus, nonnullæ ex humoribus acceduntur. Et quæ ex inflammationibus fiunt, sunt veluti quædam accidentia partium † laborantium, & morbus † φλεγμαίνων-
magna ex parte ab instrumento patiente τωρ. id est
denominatur phrenitis, aut peripneumonia phlegmo-
atque pleuritis, aut aliquid tale. Sed de his ne laborā-
postea dicemus. tium.

De febris putridis. CAP. IIII.

AT quæ ex humorum putredine febres accenduntur (ab hoc ipso nominantur febres) & sunt non accidentia morborum sed ipsæ morbi. Ex his vero nonnullæ quidem sunt sine accidentibus, quæ & mitissimæ sunt, quædam verò cum accidentibus infestant. Nos verò de prioribus dicamus febribus quæ accidentibus carent. In quibus maxime, si fieri possit, primo die qualis sit febris, acutane an diuturna, est cognoscendum, & utrum ex his quæ intermittentes dicuntur, an continua. Quod si primo statim die certa cognitio haberi non potest, secundo saltem febris forma inuenire tentandum est. Quod si neq; in hoc aliquid firmum aut stabile sciatur, in tertio saltem aliquid manifestius apparebit. Nam paucae admodum sunt, quæ, ut exquisitè dignoscantur, quartum desiderent. Ego verò quam breuissimè poterō, indicia explicare tētabo, ex quibus spe-

B

ciem febris intelliges. quanuis de istis planius ac manifestius alibi disseruimus.

De signis febriū intermittentium. CAP. V.

QUæ igitur cum rigore inuadunt, nõ ab re ex earum numero esse iudicabis: quæ per circuitum infestant. Tertianæ enim atque quartanæ in totum cum rigore faciunt accessiones. Sed tertianæ quidem in primò insultu cum nimio sæpe rigore incipiunt. quartanam autem non vidimus cum vehementi rigore incipientem, sed procedente tempore magnitudo illi superuenit, præter id quod neq; statim ab initio hæc febris vt plurimum solet inuadere: sed aliis quæ antecesserint subsequi. Quartana itaq; eas quæ errabundæ aut [chronicæ] dicuntur † propter phlegma insequitur. Quotidiana verò intermittens rarò aduenit sine oris ventriculi læsione. quemadmodum quartana ex malè affecto splene generatur, & tertiana ex iecoris affectu. Quæ verò cū valido rigore incipit, magis febris tertiana quam aliqua aliarum febrium fore speratur. Si verò & alia quæ postea dicentur signa attestentur, hæc proculdubio in prima die tertianam esse cognosces. Quòd si cū paruo rigore inceperit, tunc magis alia signa attendere mente oportet. quoniam nõ
quo

*[non est
in græ.
† Δία
φλεγμα
non est in
anti.]*

quotidiana intermittens tātum atq; quartana. sed etiam hemitritæus aut aliqua alia ex continuis esse potest. Alia verò signa & ex caloris qualitate & quantitate & arteriarum motu sumūtur. ex ipsa etiā rigoris, qui sentitur forma, anni tempore, & regione, & temporis statu, atque ex natura, & ætate ægrotantis, & iis quæ præcesserunt, & quæ sequuntur. Nam calor quidem multus & acris esse debet: pulsus autem magni, calidi, vehementes, veloces atque frequentes, omnis inæqualitatis præter quam febrilis expertes. Rigor autem, veluti si à re aliqua acuta plus, quam frigida corpus pungere-
tur. quum hi qui quartanam aut quotidianam intermittentem patiuntur, potius frigidum rigorem sentiant. Tempus autem anni æstivum. sicuti & locus & præsens status calidus. Sit autem & ægrotantis natura calidior, & biliosior, & ætas adolescentis, & exercitationes potius, quā ociositas antecesserint, magis deustio quā frige factio, & parcitas cibi potius, quā crapulæ. Vigiliæ quoque, mærores, atque labores, & intēsa cogitationes ad eundē perducunt effectū. Quòd si multos alios eodē tēpore laborantes cōtingerit tertianis corripī febribus, hoc quoq; maximū aliqd præter ea quæ nuper diximus signū erit. Quòd

ἡ δὲ ἐπιτομή
 ποτὰ τὰ
 ἰ. ε. λόγῃ
 πρᾶξις.

si hec omnia affuerint indicia, aut saltē quæ
 maxima sunt, & aut plurimū occasionis ha-
 bēt, sitis quoq; vehemēs adiungatur, vomī-
 tusq; bilis, aut sudor, vel vtrāq; supervene-
 rint, tūc nulla dubitatio relinquitur. Quòd
 si inter hac à febre quieverit homo, hac
 inquā quæ ex suo motu est omnibus nota,
 propria verò febriū inæqualitas in arteria-
 rum motu relinquatur, tunc firmiter pote-
 ris, esse tertiana febrem ostendere, ac si ter-
 tio iam die accessionem fecisse vidisses.

De signis Quartanæ. CAP. VI.

Quartana autem (nam & huius signa
 scribere oportet) manifestissimum
 sui præbet indicatiū in principiis accessionū,
 quādo rigēt adhuc qui quartana laborant.
 Nā eorū pulsus satis tardi sunt ac rari. Quū
 autem consistit febris, atq; etiam augetur,
 necesse quidem est vt. veloces fiant atq; fre-
 quētes, Servatur tamē & tūc propria ipsius
 tarditas ac raritas, si additā velocitatē atq;
 frequentia in accessionibus mediteris. Et
 quidē si cōparaueris quartanæ febris consi-
 stentiā tertianæ cōsistentiā, nō parū velo-
 cius atq; frequentius in tertianis pulsus ar-
 teriarū moveri videbūtur. Et ipsius vnus
 motus inæqualitas in quartana febre for-
 mæ eius monstrat. Nā quæ omnibus cōmu-
 nis est febribus in vno pulsu inæqualitatē,
 in

in hac manifestissimè licet cōprehendere. Multo enim velocius principiū, finemq; motus inuenies quā medium. nō tamē in tertiana ita se habet brevis etenim in ipsa est velocitatis excessus atq; in cōsistentia præsertim. Verū & caliditatis indicia diuerso modo se habent. Nā æstus & deustionem, & quendā velut feruorē, qualiter in tertianis videtur, in quartanis haud quaquā inuenies. Hæc igitur signa maxima sunt, reliqua verò externa. nā neq; hæc sunt omittēda. Sed & ægrotantis, natura est inspiciēda, si in ea atra bilis abundat, & tēpus quoque anni, si autūnus: & præsens status, si inæqualis. Sic verò & loci natura, & morborū peruagationum populariter & si lien intumuerit, febrisq; sine ordine antecesserit, & ætas senior quā consistentium, & si cū sudore febres desināt. In his vero bilis flaue vomitus minimè est expectandus, quemadmodū nec in quotidianis intermittentibus. hoc etenim tertianarum proprium est signum. At quum febris cessauerit, si adhuc signū febris remanserit, pulsusq;, his qui secundū naturā rariores ac tardiores fuerint, quarta proculdubio erit huiusmodi febris.

De signis quotidiana intermittens. CAP. VII.

Febrem verò quotidianā intermittentē vel ex his maximè signis agnosces.

B 3

Nam eius caliditatem humidiorē cū quadā acritudine esse oportet: nō quum primum manus admouetur cōfestim occurrentem, sed per morā. Nā quædam fumosa caliditas cum multo vapore commixta exire videbitur, quā magis ignis in humore suffocetur quā in ipsum possit cōvincere. Sed & his lōgè minores sunt pulsus pulsibus quartanarū, quā istarū pulsus pulsibus tertianarum. Rursus verò tanto rariiores sunt in quotidianis intermittētibus pulsus, his qui in tertianis, quāto illis pulsus quartanarū: at tarditas in vtrisque eodē modo se habet. Minus verò siticulosa hæc febris est: tantūq; eā quartana excedit, quātū istā tertiana. lingua verò & totū corpus siccissimū est in tertianis. at in febribus his humidissimum & vomitus pituitosi. & quæcūq; per ventrem excernuntur frigidiora sunt atq; humidiora & crudiora, aquosiora & pituitosiora. Vniuersum corpus deniq; in hisce febribus plenum crudis humoribus inuenitur. Et quidē ætatibus, naturis, anniq; statibus, & tēperaturis humidioribus accidunt. Nam adolescentē biliosa ac sicca tēperatura, nunquā vidi huiusmodi corripī febre. Pueri autem, & præsertim minores natu, & ex his qui iam perfectū corpus habēt, pituitosi & habitus crassi, atq; ocio plurimò de-

diti,

di, crapulis, ebrietatibus, balneis assiduis, post cibum præsertim, vtentes, à quotidianis facile capiuntur. Loca etiam humidiora atque ex anni temporibus hibernum, atque ex statibus humidiores, hanc præcipuè afferunt febrem. quod si sit etiam populo communicata, tunc præter ea quæ antea diximus signa, hoc quoque non parum ad eā diagnoscendam conducit. Non tamen harum febrium declinationes, quemadmodū tertianarum & quartanarum, sudoribus terminantur. Quare neq; ad integram quietem (exceptis paucis) perueniunt. Urinæ verò quæ procedentibus ipsis adueniunt, totius morbi tempora docent: quæ autem in principiis videtur, febris etiam speciem indicabunt. Nam in quotidianis vel albæ sunt & tenues, vel crassæ & turbulentiæ, vel rubicundæ, tertianis autem ruffæ vel subrufæ: quartanis verò variæ quidem, sed crudæ omnes: & hæc quidem sunt febrium intermittentium signa.

De signis febrium continuarum.

Cap. VIII.

Febres autē cōtinuas ex eo cognosces, quod nullū eis adest ex signis quæ intermittentibus adesse diximus, & si intra etiā quatuor & viginti horas nō cessauerit febris. Si verò iniquale habuerit incrementū

B 4

hæc quidem præter alia signa longius etiã
 tempus ostendit, & quidem si & proprium
 febrium signum in pulsibus manifestũ ha-
 buerit. Si verò inordinatio quædam ac in-
 æqualitas ipsis vel inconcinnitas adsit, &
 † In im- hoc etiam indicium simul magnitudinis ac
 pres. ἀπὸ continuitatis. Si verò in hoc statu permanē
 μίαν, in an- tes tertio die maiorem accessionem osten-
 tiq. παύ- derint, aut excrementa & urinæ omnino crũ-
 μίαν. πι- dæ apparuerint, non possunt huiusmodi
 grilia. febres ante septimum diem terminari. Si ve-
 rò & quarta dies tertiæ diei similis fuerit,
 & febris veluti deurens, neq; facies aut reli-
 quum corpus collabatur quicquam, huiusce-
 modi febris ad longius tempus extendi cõ-
 suevit. Tales quidem sunt differentię earũ
 febrium quæ accidentibus carent. Curatio
 autem cuiusque earum deinceps scribetur.
 Primum quidem intermittentium. deinde
 vocatarum continuarum. Ex intermittēti-
 bus verò breuissima ac mitissima est ter-
 tiana. lōgissima autē, ac, quantũ in ipsa est,
 haudquaquam periculosa, quartana. quoti-
 diana autē, lōga & non sine periculo. Qua-
 re ab initio statim ad vniuersum ægritudi-
 nis tempus inspicientes, rationem victus
 instituemus. Nam quæ velociter fiunt, ac ce-
 leriter ad statum veniunt, & si valde tenuē
 victũ exhibueris, non multum lædes. Quæ
 verò

verò sunt diuturniores nisi ab initio grandiori cibo reficias, hominē cum morbo pariter perimes, aut intēpestiuē victus modū commutabis. Neq; enim oportet statu accedente, grandiorē quā prius cibū offerre, sed contrā potius, tenuissimum victum qui in toto modo exhibeatur, in statum reservare: Hoc igitur in omnibus cōmune præceptum. Sed oportet præterea quæ singulis febribus intermittentibus propria sunt considerare. Veluti cōfestim in tertianis (neq; enim malè ab his initium sumēdum) primū distinguā si exquisita sit febris, & (vt quispiam diceret) legitima, aut nō exquisita sed velut nota quædam. nam quæ exquisita est tertiana, ad maximum septem circuitibus iudicatur. præter id quidem, etiam minimè periculosa. alteram verò, quæ non est exquisita, vidi quandoq; quum in autumno incepisset, in vere desisse. tum verò vt par est in tempore adeo longo, tum quia ægrotus medici præceptis nō perinde paruiſſet, sed in quibusdam deliquisset, tum quia ex hyeme læsus esset, lien maximè intumuit, & præcordia flatibus fuerunt oppleta: & iam subtumida quædam erat decoloratio in facie, ac præsertim circa crura, adeo vt nobis de adolescente dubitare contingerit, ac maioribus vti remediis fuerit necessarium. Sic

B 1

igitur nihil simile habet huiusmodi tertiana cum exquisita. Quare & ab initio eas distinguere oportet. Quantum enim natura differunt, tantum rationabile est rationem victus permutare. Ut igitur eas optimè sciamus distinguere, quæ adolenscenti acciderint mihi sat erit scribere, quæ veluti quædam exempla ac monumēta tibi futura sunt earum quæ non exquisitæ sunt tertianæ. Erat tempus anni medium inter occasum pleiadum & quod antecesserat æquinoctium. Inceperat autem febris cum horrore adolenscenti circa auroram ferè, quæ neq; in caliditate similis tertianæ videbatur, neq; in pulsibus, sed neq; vomitus bilis subsequutus est, neq; sudor sufficiens. Sed in die secundo tantummodo circa horam tertiam, pauci humidi vapores exierunt, ex quibus febris quidem exhalavit, ita pedetentim ut vix circa vespere expers febris videretur. Nam febris signum satis manifestum in pulsibus in ipso manserat. In reliquis verò circa vespere satis bene se habebat, & per totam noctem. Rursus verò circa tertiæ diei auroram, secunda accessio facta est, omnino præterquam in tempore, similis. Nam nocte superueniente, paululum ante diem vapores aduenerunt, ac circa quartæ diei auroram febris cessavit. Ac reliquo autumnii tempore, atq; hyemis

mis quo ægrotavit cum alia omnia, tum &
 tempus accessionis & solutionis febris eo-
 dem modo perseverarunt. Agebat autem
 adolescens circiter decimum octavum æta-
 tis annum. albus aspectu & pinguis. qui sæ-
 pius antea in ocio degerat, & crapulis bal-
 neisq; plurimis & repletionibus usus erat:
 Quare neque bene cibos concoquebat. Si-
 mul autem ei aduenit durities in pulsu. In
 prima autem die atque secunda, medio-
 cris: in tertia autem circa quartum atque
 sequentibus vsque ad septimum, ad tan-
 tam peruenit duritiem, vt quispiam qui so-
 li crederet pulsui multorum fore mensium
 ægritudinem iudicaret. Talis autem per-
 duravit vsque ad vernum æquinoctium, in
 quo cœpit mollescere, & rursus postea
 quadragesimo die omnino æger à tertiana
 est liberatus, tendente paulatim ad mol-
 litiem pulsu, ac minore quotidie fiente
 accessione, vrinisque † meliorem habentibus †
 substantiam. Et hæc quoque in prio-
 re tempore erant admodum crudæ. Ta-
 lis quidem est tertiana quæ alterius ex-
 quisitæ maximè contraria existit. Reliquas
 verò intermediæ haud numero paucas,
 ex extremis quæ determinata sunt, non
 difficulter inuenies. Quæ enim in prin-
 cipio sermonis tertianarum febrium in-
 dicia

dicia scripsimus, si omnia affuerint, exquisi-
 tam reddunt tertianam. Cuius accessionis
 tēpus breue, quatuor aut quinque aut sex,
 at longissimè, vndecim aut duodecim ho-
 ras complectitur. Et huiusmodi febrium
 vring, tertio die, ad summū quarto, coctio-
 nis signum ostendunt. hoc quidē pacto ex-
 quisitam aut non exquisitam tertianam co-
 gnosces. Eadem quoq; ratione & quarta-
 nam & quotidianā. Cui enim omnia insunt
 indicia quæ in quartanis febribus antea scri-
 psimus hæc vera atque exquisita quartana
 est: cui verò minimè, spuria est & nequaquā
 exquisita. Et quotidiana quoq; cui omnia
 quæ diximus insunt, exquisita est. Quæ au-
 tem eam naturam non habet, non exquisi-
 ta. nō igitur nothæ minimeq; exquisitæ fe-
 bres diurnæ sunt, vt quotidianæ & quar-
 tanæ. Cæterū quemadmodum exquisita
 tertiana brevis est tēporis, sic & quotidia-
 na & quartana diurnæ. Hæc quidē in his
 qui per circuitum quendā febricitant, opor-
 tet considerare. In aliis autem febricitanti-
 bus, vrinas atque excrementa atque vniuer-
 sum corporis habitū inspicere oportet: ca-
 lorem quoque atq; arteriarum motum, &
 quæcunque alia præter hæc Hippocrates &
 lōgus vsus inspicere iubent. veluti regio-
 nes, anni tēpora, & cōstitutiones, & ætates,
 corpo

corporum temperaturas, consuetudines, & causas antecedentes, & quæ simul cum morbis inuadūt, & quæ in medio tēpore apparent. iam totū cuiusdam videri potest adnotum esse, non tamen res ita se habet. nam quiddam maximum etiā inter hæc omnia, breue tamē dictu, nondū scriptū est. Quid verò hoc est? Morbi quātitas ac viriū. Res quæ ad eā rē explicandā vno indiget verbo, ad vsum verò permagna est. Neq; enim bene prænoscere possumus, nisi horū singulorum magnitudinē diligenter pēsitemus. Nam vtrum morbus sit exitialis an non, & quando magis debeat mori, an sanitati ægrotus restitui, nisi omnia quæ diximus diligentius animaduertens ad duo redegeris capita, ad ipsius scilicet morbi magnitudinem & ægroti vires, nō poteris verè prænoscere. Nam si vires adeo validæ fuerint vt possint morbū superare, necesse est ægrotum euadere. Si verò cōtrā, omnino morietur. Nō igitur solū inspicias, qualis sit morbi species ac forma: sed & eius magnitudinem aduerte. Non paruum autē hoc exigit experientiam tum alias ob causas, tum quia neq; scribi, neq; omnino sermone edoceri singulorum quātitas potest. Quod si quid in nobis est, ex nulla re adeo possumus ad exquisitā peruenire notitiā, quantū ex crebra

bra exercitatione circa quantitatis conie-
cturam. Hoc quidem in ipsis operibus & di-
scere & docere possibile est. Quaecunque
verò in qualitate determinantur, hæc dili-
genter ac manifestè quam breuibus pote-
rimus verbis transigemus.

De cura febris tertianæ. Cap. IX.

EX quilitam ergo tertianam, ut quæ ex
flaua bile commota inualeſcat, quàm
maximè fieri poteſt, refrigerare oportet ac
humectare. Nam contrariorum contraria
remedia ſunt. quæ quidem quod ſuperfluum
eſt, reprimant: quod verò deſicit, ſuppleant.
At flauæ bilis humor, omnium qui in cor-
pore ſunt, aridiſſimus calidiſſimusque exi-
ſtit. Hunc igitur quum ad ventriculũ repit,
per vomitum educere oportet: quum verò
vergit ad inferiora, eodem modo per infe-
riorem excretionem. hoc quidem & ſponte
fieri ſolet in tertianis exquisitis, Per urinã
quoque & ſudores oportet euacuare. Iuvat
autem & per inferiores partes bilis expur-
gatio. venter autem mollibus clyſteribus
exinaniedus eſt. Urina verò, potionibus in
quibus apium, aut anetum madoerunt, pro-
uocanda. Et ſi tibi coctionis ſignã moſtran-
tur, iam cum fiducia aliquid abſynthij po-
tes exhibere. quod alioquin ſummũ eſt ſto-
machi remedium vbi bilis infeſtauerit, ſi
præ

praesertim ex ipsius coma quantum sufficiat
 accipiens mellicrato intinxis. Balnea verò
 calida ex aqua potabili profunt tū quia ali-
 quid bilis educūt, tū etiā quia sua qualitate
 plurimum iuuāt. Nam huiusmodi balnea
 humectant ac potētia refrigerant. Marinae
 autē aquae & salinae, nitrosae atq; sulphureae,
 plus quidem bilis educūt, sed multo minus
 quam potabiles profunt. Praestat verò neq;
 ipsas vtilis dicere, quādoquidē plus quali-
 tate nocēt quā euacuatiōibus iuuēt. Equi-
 dem noui quēdā corrupto iudicio hisce bal-
 neis vti persuasum, deinde resiccato corpo-
 ris habitu ad tantā venisse perniciē, vt tabe
 cōsumptus interierit. Reliqua verò victus
 rō ad bilē etiam excernēdā exhibita est. † In vete-
 Semper autem oportet contrarias qualita-
 tes illis quae praeter naturā inualuerint op-
 ponere, quum hoc multo plus iuuēt quam
 quomodolibet euacuare. Sed neq; hoc ipse
 nouerat, neque alio docēre didicerat. Hae
 igitur in balneis intentio sit, vt corpus ma-
 deat atq; humectet, atq; idcirco neq; nitruū,
 neq; sal neq; sinapi adiungere oportet (quod
 genus mali cōplures a grotis afferre viden-
 tur) at vbi plurimū olei calidi infuderis, ad
 aquam perducere ac madefacere. & si in ea
 natate voluerint, quantum id facere possunt
 permittendū. At qui balneis admodū dele-
 ctan

Etatur, si etiā bis in die lauari permiseris, nō
 aberrabis. sed illud semper habeto in me-
 moria, vt tempestiuē id faciāt. Si verò etiā
 coctionis signa ostēdantur, etiam si sapius
 laueris, nihil deliqueris. A vino verò, ante-
 quam morbus coquatur, omnino abstinē-
 dum. At vbi concoqui cœperit, dandum est
 ab initio tenue, aquaticum, & paucum, vbi
 verò iam prope est vt morbus soluatur, am-
 plius est offerendum. Cibi autem quicūque
 humectant atque refrigerant, omnes vtilēs
 sunt exquisitis tertianis. Quantitas verò in
 ipsis sit tanta, vt bene cōcoqui possint. Ex
 oleribus quidem, attriplex, blitum, lapa-
 thum, & malua, & lactuca, & cucurbita. Ex
 aliis verò ptisanæ succus, & ex aliqua sorbi-
 tiones, & ex piscibus saxatiles. Ex volatili-
 bus autem, quæ mollibus cōstant carnibus.
 Quæ autem talia non sunt, eorum alæ. Te-
 † In græ. sticuli quoque gallorum, & suum pedes &
 legitur cerebra. Paruorum verò si etiā dederis car-
 nes assatas: nihil nocebis. Sed & oua ad sor-
 bendum sunt offerenda, & præsertim vitel
 quod alij li eorum. nam hi facilius quàm pars alba cō-
 coctura il coquuntur. Ex fructibus autem permitten-
 liquefa- dum est vt illos degustent qui non sunt o-
 ctas car- mnino difficiles concoqui. Oportet absti-
 nes inter- nere à melle, sinapi, & salitis, atq; omnibus
 pretantur acribus, & à vinis & satis vetustis, & quæ
 na

natura sunt calida. Hæc quidem sit victus ratio in pluribus veluti ad coniecturã exposita. Qui verò non admodum delitiosi sunt, his talis victus est instituendus qualẽ nosti me aliquando instituisse in exquisita tertiana secundum sermonem Hipp. ex succo ptisanæ vsque ad crism: hæc quidem in exquisitioribus tertianis seruare oportet.

De tertianæ non hæc cura.

CAP. IX.

IN his verò quæ nõ adeo exquisitæ sunt, prouidendum est pro viribus ne morbus augeatur, nève ægrotantis vires prosterantur, quæ longiori tempore debent laborare: difficilè verò est seruare vtrunque: quoniam inedia quantum profunt ad morbi cõcoctionem: tantũ vel amplius officiunt viribus. Cibi verò quantũ ægroti robur adaugent tantũ coctiones impediunt. Sed & id quoque noscere opus est, ad quantã magnitudinem perueniat morbus, ac quantæ sint ægroti vires: vt ad ea inspiciens quæ maius auxilium exposcunt, inedia quidem in valentioribus vtaris viribus, & morbo coctu difficili: largiori autem cibo, vbi vires sunt debiliores, neque morbus admodum concoqui contumax. Hæc quidem & in omnibus aliis morbis considerare oportet. In tertianis verò non exquisitis neque

C

statim circa initia balneare expedit, sed quū
 primum coctionis signa apparuerint. Neq;
 quotidie cibum oportet exhibere, sed al-
 ternis diebus. Quies verò & calefactio cir-
 ca præcordia iuuant, & sorbitiones conco-
 qui faciles, & clysteria nō admodū mollia.
 Quod si sanguinē mittere oporteat neque
 hoc quoq; omittendum. Sed ab initio sta-
 tim adhibita earum rerum quas scis distin-
 ctione, tātum sanguinis mittēdum quantū
 præsens exigit status. Sit autē totius victus
 ratio, nō quæ humectet atq; refrigeret vni-
 uersum corpus, qualis in exquisitis exhi-
 betur tertianis, sed & aliquē modum assu-
 mat ad calefaciendum atq; incidēdum. Plu-
 rimum igitur eos iuuat prisanæ succus pi-
 pere adiecto, vel etiā hyssopum vel origa-
 num, vel spicam nardi mulsa infundens &
 decoquens ad bibendum propina, & quæ-
 cunque alia prouocantia urinā, præterquā
 illa quæ suprā modū calefaciunt atq; exic-
 cant: maximē verò post diē septimā, danda
 est iugiter absinthij coma. Et quidē oxy-
 mel potione plurimos iuuat, & aliquid ex
 his quæ molliter ventrem subducunt, qui-
 bus me assiduē vti nouisti. Vomitus autem
 post cibū, adeo his quibus hæc febris per-
 durauerit utilis est, vt multos sciam solis
 vomitibus statim fuisse curatos.

De

De cura quartanarum.

CAP. XI.

DEinceps de quartanis dicemus: quas etiā ab initio mediocriter ac leniter tractare oportet, nullū fortē medicamē aut euacuationē exhibentes, nisi fortē sanguis vehementer superabundans appareat. Et si vena incisa, is qui fluit, niger videat ac crassus (præcipuē verò in his qui liene laborant huiusmodi visitur) audacius mittendus est qđ si flavus aut tenuis apparuerit, statim suppressendus. Venam verò secare oportet, vel interiorē, aut mediā quæ est in sinistro cubito. Victum deinceps instituere sine flatibus ac optimū vētrē, quātum possibile est, mollē facientes his quæ vsitata sunt. Quod si hæc nihil proficiāt, clysteribus vtēdū est, à principio quidē mollioribus postmodum verò acrioribus. Arcēdi sunt autē à carnibus porcorum, atque ab omnibus edulibus quæ tenacia sunt, & tardū habēt exitū, ac quæ refrigerāt exiccātq; corp⁹. Vino verò vtēdū est albo ac tenui ac mediocriter calido: & volatilib⁹ quæ boni succi sunt, & nō in paludibus degūt. Pisces autē adhibēdi cōcoqui faciles molles carnibus nihil tenax habētibus. Vtēdum est autem salsamentis & sinapi. Et certis diebus, id medicamen quod diatrion pipereon vocatur, vel diospoliticum est

C. 2.

assumendum. Et si quotidie piper tantum cum aqua biberent, rectè etiam facerent. A frictionibus autè & ambulationibus & balneis atque aliis vſitatis non sunt penitus prohibendi. Et si omnino possent à balneis abstinere, solis contenti frictionibus, quàm plurimū ex eo iuuamen admitterent. Et si quartana febris brevis sit, neq; admodū violenta, nihil nocuerit, si diebus interiectis ad consueta exercitia se transferant. Hæc quidem ab initio & vsque ad statum sunt peragenda. Si verò in statu morbi præcipuè ægrotus esse videatur, tunc subtilioris vſus ratio est adhibenda quàm antè vel post. Statim verò præcipiendū est vt diu cōquiescat, ac visceribus prouidendum, vngendo atq; emplastrādo his quæ mollire ac laxare possint: deinde medicamentis vtendū, quæ ciendi vrinam vim habent. Et si coctionis morbi inditia apparuerint, tunc purgare oportet his quæ humores atros exinanēdi vim habent, non semel tantū, sed sæpius si fuerit necessariū. Vtendū autè & vomitibus statim à cibo, & si nihil prohibuerit, elleborū album est exhibendum, primū quidē permixtum ꝑ radicibus, quòd si nihil profecerit, elleborum ipsum. Qui verò nequeunt euomere, hi per inferiora vehementius sunt purgādi: hisq; deinde medicamen
confe

† ράξι-
σιρ.

confectum ex viperis in potu dandū, & alia
 quæ ad huiusmodi febres cōmendantur,
 ex quib⁹ est & illud nobis familiare præ cæ-
 teris laudatissimū, quod succū cyrenaicum
 recipit. Quicumq; verò ab initio aliquid ex
 his medicamētis exhibuerunt, aut omnino
 ante statum, quartanā quæ erat simplex sæ-
 pius fecerunt duplicem, aut omnino maiore
 ac difficiliorē: ex duplici autem: triplicem,
 aut omnino ambas difficiliores maioresq;
 reddiderunt. Noui autem medicū qui au-
 sus est homini qui triplici quartana labo-
 rabat, medicamē ex viperis exhibere, quā-
 do nondum morbus in statu esset: deinde
 (vt par est) auctis omnibus, febris conti-
 nua subsecuta hominem occidit.

De cura quotidiana.

CAP. XII.

Quotidianā aut quū volueris curare,
 oxymelite vt ere post primos dies † Alij le-
 & illis quæ probè possunt vrinā validè cie- gunt non
 re. Et vniuersum totius victus caput sit ad χρῶμετα
 incidendū efficacius. Circa statū verò, de τας πρῶ-
 ventriculo est habēda sollicitudo, ac de eius τας ἐμι-
 ore præsertim; deinceps iubendum est vt τας, sed
 post radices & cibos assumptos euomant, χρῶμεθα
 his etiam quæ pituitam subducunt vt edum τας πρῶ-
 reliquam verò victus rationem ad commu τας ἐμι-
 nes intentiones inspiciens, inuenies. τας.

i. utimur
primis die
bus, cui le-
thiōi asti-
pulsatur
Pan. libro
2. ca. 24.

De cura febrium continuarum quæ carent
accidentibus. CAP. XIII.

Continuas autē febres quibus quidem
status morbi nō ultra septimam futu-
rus est, & vires validæ sunt, atque ætas con-
sentit, his quidē admodum exquisitus & te-
nuis victus est instituendus. Quibus verò
vel status totius morbi longius abest à se-
ptima, aut vires robustæ non fuerint, hi ab
initio vberiori cibo sunt reficiendi, propè
verò statum, tenuiori. Quum autem iam
adeo status, tenuissimū victū servare opor-
tet, deinde rursus semper vberiozem: ac po-
tius simile augmentum rursus efficere, huic
qui antè statum fiebat decremēto. Sangui-
nem verò mittere oportet & ob morbi ma-
gnitudinē. Et quibus rubor multo plusquā
naturæ conueniat, & maior quam pro con-
suetudine totius corporis tumor, & venæ
eminentēs atque extēsa, his est auferendus,
nisi vires aut ætas aut aliquid eorum quæ
suprà commemorauimus, prohibuerint.
Quod verò humidus victus in febribus
acutis omnibus iuuat, pridem rectè dictum
est. Cremorē igitur ptisanæ, his quibus non
acescit exhibere oportet, & mellicratū qui-
bus non bilescit & sorbitiones ex alica, &
panem ex aqua, & quæcunque alia eandem
aut similem vim habent. Quæ præter mo-
dum

dum calidæ & ardentes sunt, quum primū
videris coctionis signa, tunc audacter aquā
frigidam potandam exhibe: modus verò in
quantitate seruetur, quemadmodum tem-
pus anni, regio, ætas, & natura: & consuetu-
do etiam exposcit. Talis quidem est, vt in
vniuersum dicam, febrium quæ accidenti-
bus carent curandarum ratio.

*De curatione febrium cum
accidentibus.*

CAP. XIII.

QUæ verò cum accidentibus sunt, nō
æquē simplicem exigunt curatio-
nem. At pro viribus metiendum est quan-
ta sit febris, quantūve ex accidētibus pe-
riculum immineat: atque ad id quod vehe-
mentius ac difficilius, intendendum, non
posthabita omnino etiam alterius cura.
Age enim, si quis febricitet [et eorum qui non
sunt habitus plenioris], verū ex recenti-
bus cruditatibus angorem quēdam sentiat *†Locus in
græcis cod.*
ac morsum, atq; os ventriculi pressum, vel *impres-*
si etiam humorē aliquē malum euomuerit, *sis legitur*
& in huius transitu non parum fuerit offen- *negatiue,*
sus adeo vt difficilē ferat atque molestē, *sed in ve-*
nunquid hic ad febrē respicientes, solā mul- *teri legi-*
titudinem euacuare tētabimus? quod alio- *tur afir-*
quin sine molestia faceremus, an prius ori *matum est*

sit verten ventriculi providebimus? ac postea sic, ubi
dum, ad- circa hoc bene se habuerit, quā licuerit to-
sit autē ea tius corporis euacuationē faciemus? Mihi
dispositio quidē ita agendum videtur. Multos itaq;
que phle- vidi qui ita affecti erāt, quosdam interiisse,
torica ap- nonnullos ad extremū periculū fuisse per-
pellatur. ductos, quum medici eos vacuare tētaissent
 antequā os stomachi corroborassent. Sed
 neque si fuerit febris cum profluvio vētris,
 alia est opus euacuatione: verūm hæc sola
 sufficit, quāvis non sit pro multitudinis ra-
 tione. Quicunque enim his plus adimere
 fore necessarium putantes, aut sanguinem
 mittere aut ventrem mouere tentarunt: in
 grauiora pericula duxerunt. Sed neque si
 quis simul & distentione neruorū laboraue-
 rit, & sanguis egerit missione, neque huic
 tantum semel mittere oportet quantū exi-
 git morbus, sed aliquid etiam accidenti est
 relinquendum cuius causa sæpe sudores eue-
 niunt, & vigiliæ molestant, & vires ægroti
 debilitantur. Ita etiam si vehemētes vigiliæ
 aut dolor intēsus ægrotū infestāt, cauendæ
 sunt subitæ ac multæ euacuationes. Ipsa
 prætereā ambiētis aëris tēperies loco acci-
 dentis cuiusdā habenda, quando exquisitè
 calida ac sicca fuerit, qualis est tēpore me-
 dio inter canis ortū & arcturi: atq; ideo oēs
 quibus medici nihil omnino de temporum
 statu

statu cogitantes sanguinem abstulerunt, in-
 terierunt. Si etiā valdè frigida fuerit, tunc
 quidem sanguinem mittere est formidand-
 um. Neque illud ignorare oportet, non
 parua ex similibus rebus sequi pericula
 interierunt autem nonnulli qui in calidis ad-
 modum temporis cōstitutionibus non re-
 ctè euacuātur, ex defectu animæ, quæ synco-
 pen vocāt, & dissolutione. In frigidis verò
 cum accessiones incipiunt, vehementer re-
 frigerati nequeunt tolerare. Ob hæc igitur
 neque in locis suprā modum calidis aut
 frigidis, sanguinem mittere audemus. Sed
 si regioni temporis status cōsentit omnino
 abstinemus: quum verò non consentit, eua-
 cuamus, quidem sed multo minus quam si
 neutrum prohiberet. Tanquā etiā accidens
 quodā agrotātis, ad patiēdum facilitatem
 cōsiderare est necessarium. Multi enim
 neque vnquā fuerunt euacuati, neque eua-
 cuationē vllam integrā, aut inediā lōgam
 possunt perferre, sed aliis quidem ob ista
 facilè totius corporis robur labefactatur:
 aliis verò os vētriculi malè afficitur, adeo
 vt cibos abhorreant: quod si eos cogantur
 assumere, aut nō retinent, aut male conco-
 quunt. In hac dignotionis parte, etiā agro-
 tātis temperaturā cōtēplari oportet. Qui-
 cunque enim calidi & sicci natura sunt, hi

omnes facilè ab integris euacuationibus of-
fenduntur. Et cōsuetudo quoq; non parui
momēti est, cum ad omnia alia, tū prācipuè
ad euacuationis indicationē. Quidā enim
nunquā prius fuere euacuati, neq; vnquam
euacuationē integrā pertulerunt, & multis
cibis vti sunt. Nōnulli cōtra, neq; multis ci-
bis vti fuerunt, & euacuationibus sunt as-
sueti. Hos igitur intrepidè euacuare opor-
tet quādo & reliqua etiā cōsentiunt: alios
verò, nec si omnia alia id suaserint. Eodem
pariter modo & corporis habitus cōfide-
rare oportet. Nam qui dēsa & solida carne
cōstāt, his habitus haudquaquā facilis pati.
Quare nō oportet vereri ipsos euacuare ex
toto, si quidē & alia id iubent. Sed qui mol-
lem & tenellā & diffluentē habent carnē,
hi mirum in modum sunt ad patiēdum ha-
biles. Quare & si reliqua omnia sanguinē
esse minuēdum persuadēt: nō tamē id face-
re audendum est: sed aliis euacuationibus
quātum moderatè & cōsideratè fieri pōt,
utiēdum est. Eodē modo & quicunq; supra
modum crassi sunt aut macilēti: nam & his
venā incidere cauēdum est, aliasq; euacua-
tiones integras vereri oportet. His etiam
& ætas annumeranda est veluti accidens
quoddā, quod prohibendi integrā vacua-
tionē vim habet, neq; enim pueri, neq; senio

res hanc sine noxa tolerant. Hosce igitur omnes quos diximus, ubi dispositiones horretur, non semel neque ex toto, sed paulatim oportet euacuare inediis moderatis & frictionibus, & clysteribus mollibus, humectationibusque & cataplasmatibus & balneis. Quorum singulorum indicationes rursus ab his quae antea diximus, sunt assumenda. Ita etiam si quando duo contraria accidentia consequantur, inspicere oportet utrum eorum sit fortius. Eodem modo si duo morbi eundem hominem obsederint, qui invicem pugnares habeant indicationes. Nam & tunc quoque adversus id quod magis urgeat instandum, neque alterum omnino negligendum. Eas vero quae habentur ex accidentibus & morbis indicationes, non simpliciter, sed secundum causam a qua singula sunt considerandum, qualia sunt defectus animi & dissolutio. Nam consuevit re medici de una re haec duo nomina dicere. Est igitur res ipsa quidem una, eius vero sunt plures causae. Nam animo deficiunt & in morbo cui cholerae nomen est, & in profluviis ventris, & difficultatibus intestinorum, ac laxitatibus, & muliebri fluxu, & vulneribus, & haemorrhoidibus emanantibus & reiectionibus sanguinis, aut profluvio sanguinis per nares aut alios meatus, & in matricis post partum purgationibus immoderatis.

Non

Nonnunquam verò & vehemens cruditas animæ defectum attulit, & tunc præsertim quum ventrem supra modum soluerit. Et qui morbus bulimos appellatur, nihil aliud est quam animæ defectus. Omnem præterea quæ ex matrice prouenit strangulationem, defectus animi antecedit, sicuti ad matricis versus superiora recursus & ad latus inclinationes atq; inflammationes plerumque consequitur. Antecedit autem

† Apople- † morbum attronitum, & comitiale quum
xiam. malignior existit, & resolutiones, & syncope, & tabem. Sed & in principiis febrium non admodum paucarum aduenit, & tunc præsertim quum supra modum aut siccum & squalidum aut plenum immoderate corpus extiterit. Et nonnunquam etiam simul cum febre ardente atq; maligna inuasit: & quibus extremæ corporis partes in accessionibus febrium plurimum sunt refrigeratæ. Et quicumq; ob inflammationis magnitudinem vel hepatis, vel ventriculi, vel stomachi febricitant, his etiam in principiis accessionum animi defectus adueniunt: illis præsertim quibus humores crudi minimeq; cocti redundant: aut qui aliquam præcipuam partem obstruam habent. Animo etiã deficiunt quibus os ventriculi male affectum est, aut humorum vitio mordicatur, aut crassis, aut lentis, aut humi

humidis vel frigidis humoribus aggrauatur. Quidā etiā in vehementibus animi affectibus animo defecerūt, sed præcipuè senes, & qui alioquin sunt imbecilles. Etenim plures eorū tristati, aut lætati, aut irati animo defecerūt. Est verò vbi roridæ humiditates quādā his ita affectis haud in tēpore superueniētes, animi defectū inducunt, sicuti & qui magis robusto sunt corpore, ex immoderatis sudoribus idē patiuntur: & si abfcessus quispiā terumpat, *vires vehementer lædit, ac tū præcipuè quā materia simul tota ad ventriculū vel vētriculi os aut thoracem defluxerit: Et si quādo etiā nos abfcessus fecantes, totum simul emittere pus tentauerimus, animi defectum subsequi est necessariū. Et si quandoq; purgantes, aut clystere abluentes, aut quomodocunq; euacuantes: id aliquo modo vehementius quam oporteat egerimus. Neq; enim in morbo inter cutem tota simul humiditas (quāuis ea superfluitas sit præter naturā) potest sine noxa euacuari, sed tūc quoq; necessariū est hominē deficere animo. At verò ex vehementia dolorū veniūt dissolutiōes, quum morsus quidā ac tormina, aut ilei, aut intestini crassioris affectus subitò accidūt. Sed & neruus percussus & musculi caput, animi defectū intulerunt: & maligna in articulis

vlcera

† παρειν.

i. rūpatur

* In ant.

τὸ μὲν τὸ δ'

cu πῶ δ' ὁ

ναμιν ἰσ-

χυρᾶ. i. ei

qui nō ad

modū va-

lidis sit vi-

ribus. Et

ita οἷο λε-

gendū est

† τοῖς ὁ δ'

τοῖς, id est

aqua iter

cutē labo-

rantibus.

* in imps.

κελιχῆς.

in ant.

κοιλιχῆς

i. ex diu-

turno sto-

machi vi-

tio alui

fluor.

ulcera omniaq; gangrenosa, & depascētia,
 & immoderata quædā frigiditas, aut calidi-
 tas, vitalisq; roboris dissolutio, hæc quidē
 sunt defect⁹ animi causæ. Atq; singulæ ea-
 rum propriam curā desiderāt. at de omnibus
 quidem nunc scribere nō est opus. nā quæ
 passionibus assidēt, sine illis curari nō pos-
 sunt. Tātum igitur in præsentī sermone de
 ipsis dicemus, quātum edoctus quispiā pos-
 sit his quæ repētē ingruunt, accessionibus
 occurrere. Veluti, verbi gratia, eos qui ex
 choleris, & vētris profluuiō, & aliis tū largē-
 tum impetu vno factis euacuationibus dis-
 soluuntur, frigida spargere oportet, & na-
 res cōprehendere, & os vētriculi perfrica-
 re, ac iubere vt euomat stomachum irritan-
 do digiti velpēnæ immisiōe, sed & manus
 & pedes alligare. Oportet autē nexus fieri:
 ¶ *In ant.* plures quidē, ac fortiores circa manus, quā
oxia, id do per inferiores partes fiunt euacuationes:
est crura. quēadmodū in hæmorrhoidibus, & vētris
 profluuiō, & quæcunq; per matrices fiūt in
 mulieribus vacuationes. Nā si tunc crura
 fortius ligētur, sapius aliquid ad partes in-
 feriores attrahitur. Contra autē fit in fluxi-
 bus sanguinis factis per nares atq; vomiti-
 bus, vbi plures ac vehemētiores ligaturæ
 in cruribus fiunt: & quidem quibuscunq; in
 vulneribus sanguis emanat. Eodē modo si

ex

ex superioribus partibus accidat, inferiores: si ex inferioribus, superiores vinculis sunt astringendæ. Situm quoq; aliquē in aduersum tendentē parti expedit inuenire, non tamē hoc multū fiat. Nā si nimium tendatur, atq; ex hoc fatigetur, nihilominus irritatur quā si inclinaret ad eundē. In vniuersum autē, aut ad cōmunia mēbris patientibus in aduersum trahere oportet, aut ad ea in quibus est euacuationis origo. Atq; *† Videtur* ideo vehemētes euacuationes quæ ex ma- *legendum* tricibus sūt, cucurbitulæ mamillis apposi- *esse fluxio* tæ statim sedāt. Quæ verò ex naribus, he- *nis.* pati ac speni secū dū narē patiētem, quòd si ex ambabus natib⁹ simul plurimus sanguis efflueret, vtriq; visceri sunt adiciendæ. Vinum etiam aqua frigida temperatum curat eas quæ ex magnis sūt euacuationibus dissolutiones, & tunc præsertim quādo ad vētriculum fluunt humores. Sed aduertendū est an aliquid sit quod prohibeat huiusce- modi exhibitionē, veluti si aliquod ex visceribus inflammationem patiatur, aut caput vehemētius doluerit, aut passio aliqua quæ delirare cogat affuerit, aut febris ardēs in morbo crudo. Magna enim & quasi insanabilia ex potu vini in huiusce modi affectibus nocumenta proueniunt. Quòd si nihil prohibeat, postmodum ægrotan-
tis

tis naturam & consuetudinem & ætatē & ambientis aëris temperaturā considerare oportet. Ad hæc enim respiciens, vel frigidum, vel calidū potum exhibebis. Nā qui assueti non sunt potare frigidū, aut manifestè ex ipso offenduntur, & quicunq; natura sunt frigidiores, & qui in extrema sunt senectute, & loco degunt naturā frigidiori & tēpore hiberno, cauere frigidū oportet, atqui cōtrario modo se habēt, hisce intrepidè offerre. Sit verò vinū in fluxionibus quæ ad ventriculum sunt, calidū & tenue, quale lesbium. In sanguinis autē fluxibus, crassum ac nigrū & acerbū. Iphis verò locis imponere oportet, veluti vētriculo, & matrici, & stomacho, & thoraci quæ corroborādi vim habent, capiti autē & frōti, præter hæc, illa etiā quæ refrigerāt. Et quibus *ἐπιπολῆς*. vel in summis partibus, & in naribus vena aliqua disrupta est, medicamen aliquod ex perficie. his quæ sanguinem suppressere possunt, & καὶ μὴ imponendum. Balneæ verò in fluxionibus *διὰ βλάβος* quidem ad ventriculum aptissimæ sunt, at *πρῶτα* sanguinis verò fluxum acriter irritant. Et *παρὰ τὴν* quicumque ob sudoris multitudinem animi *μὲν*, id est defectum patiuntur, his etiam plurimum *καὶ* nihil nocent, hos enim astringere oportet ac re- oīo calidū frigere, ac non laxare cutem, & vinum frigidum præcipuè his exhibere, & neque ali- quo

quo pacto calidum offerre. Sed neq; etiam
 artus ligare oportet, neq; cogere ad vomitum,
 neq; vlllo modo mouere. at ventis refrigerantibus
 aditus præparare, aërē quoq; domus alterare
 frigida atque acida qualitate, myrtorum frondibus,
 & vitium capreolis, ac rosis pauimentum cōsternentes.
 Nihil verò horum cōfert vbi ad ventriculum
 fluxiones fiunt. nā quo magis cutē densaueris,
 tanto ipsæ magis augentur. His igitur qui ex euacuationibus
 dissoluuntur, ita cōfestim succurrendum est. At qui ex multitudine
 laborant, non ita, verum in illis artus quamplurimum
 fricare oportet, calefacere atq; alligare. A vino verò
 & cibis abstinendum, & balneis etiā si febricitauerint.
 Suficit autē si eis dederimus mellicratū potū, in quo
 ebulliuerit thymus, vel origanum, vel pulegiū, vel hyssopus,
 cōuenit quoque oxymel, [& ligare ac fricare manus
 potius quā crura. Et quæ etiā ex matrice laborant
 atque exoluuntur, non aliter curandæ sunt excepto
 exymelle, fricare etiā atq; alligare magis crura
 oportet quā manus, & quemadmodū in multo effluxu
 cucurbitas in mamillis imponimus, sic† quibus
 vterus aut sursum aut ad latus trahitur, in
 guinibus, & coxis adhibebimus: & naribus quidem,
 ea quæ foetidissimū odorē habent, matricibus

Hæc in

græ. non

habentur.

† In græ.

ē αἷς ἀντ-

σπᾶδα

ναὶ τῶν

ματρικῶν.

D

autē odorata, ea etiam quæ laxare ac calefa-
 cere possint medicamēta afferemus. Si ve-
 rò os ventriculi fuerit imbecille, atq; ideo
 animi sequatur defectus, ea quæ roborandi
 vim habent oportet emplastra adhibere,
 quale est quod fit ex palmulis, vino, farina
 hordei, croco, aloë, ac mastice. Madefacere
 autē his quæ cōstant ex absinthio, & oleo
 melino, & masticino, & nardo, † & vino. Et
 si exuratur, miscere ex refrigerantibus ali-
 quid, veluti cucurbitæ succū atq; lactucæ,
 & portulacæ, & solatri, & * intybi, & vuar
 acerbæ, hæc quidē nō solū refrigerat, sed
 etiā astringit. Aqua etiā frigida plerunque
 iuuat affectos stomacho si opportunè de-
 tur, alioquin plurimū obest. Atq; his qui os
 vetriculi imbecillū habent, vinū calidum
 potius oportet exhibere, si nihil sit aliud
 quod prohibeat. Plurimum verò iuuat eos
 qui ita laborāt, etiam frictio extremorum.
 Quod si ex his remediis nihil melius se ha-
 buerit, eos quidē qui adusti sunt quāprimū
 ad balneas ducere oportet, Qui verò aliqd
 frigoris sentiūt, medicamēta triopipe-
 reon nominatū, atq; ipsum piper solū, atq;
 † absinthiū bibant. Qui verò ex vitiosis hu-
 moribus os vetriculi mordicantibus disso-
 luūtur, hos post aquæ calidæ, aut hydrolei
 potum fac euomere. Quod si difficulter
 euo

† Additur
 in græ.
 nā dīdēv-
 ōng. id est
 ex anan-
 the, sed in
 impres.
 corrupcē
 legitur.
 dīdēv ōng.
 * oīps.
 * Addit
 ant. dīdēv
 pax xēp. i.
 in declina-
 tione.
 † In ant.
 additur
 pōvs, id est
 solum.

euomant, prius cōcalefacere oportet quæ
 os ventriculi circumstant loca, & manus, &
 pedes. Quòd si neque hoc modo possunt
 euomere, digitos aut pēnas demittēdo irri-
 tare oportet, quod si neq, sic euomant, rur-
 sus his oleum calidum quā optimū exhiben-
 dum. Solet autem sapius oleum nō solum
 ad vomitū irritare, sed etiā ventrē mollio-
 rem facere. Non parum enim ad præsens
 est vtile. Quare nisi spōte accidat, arte pro-
 curandum est: præcipuè verò † & appositis † τοῖς πρῶ
 hoc tētādum est facere. Quòd si ex istis fa & τοῖς
 cilius fiat etiā absinthij comam in mellicra-
 to decoquēs ad potādum exhibeas, atque
 deinceps vinū, deinde omnibus modis mē-
 bra oportet corroborare, partim his quæ
 extrinsecus apponūtur, partim absinthij po-
 tionibus, nō tamen id in principiis faciendū
 suadeo, sed postea, quando circa ventrem
 partes fuerint expurgatæ. Quando verò
 adhuc humores in ipsis continentur, non-
 dum astringere, sed tantum concalefacere
 (vt antea diximus) cōuenit. Vbi verò mul-
 ta pituita in ore vētriculi fuerit acervata,
 fouere quidē plurimum oleo in quo absin-
 thium ebullierit: postea verò mellicratum
 exhibere, in quo vel hyssopū, aut aliquid si-
 mile infusum sit, itē oxymel, & piper, & dia-
 trion pipereon & dio spolicō medicamē:

viētus ratio in summa incidēdi vim habeat. Quæ verò ex nimia frigiditate veniūt exolutiones, eodē modo curādæ sunt quo bulimi, omni modo calefaciēdo. Vinum igitur eis exhibere oportet calida tēperatū, ac cibos qui calefaciendi naturā habent, fricareq; ac calefacere ad ignē simul, Qui verò ex nimio calore accidūt animi defectus, his quæ refrigerādi ac corroborandi vim habēt, hi verò maximè eueniunt iis qui in aēre suffocante ac balneo cōmorantur. Statim igitur ipsos corroborabis si aqua frigida sparseris, & flabellaueris ad vētū cōuersos, & os vētriculi perfricaueris, atq; agitaues, ac postmodū vino ciboq; refeceris. At qui ob inflāmationis magnitudinem aut vehēmētis febris malignitatē, animi defectū patiuntur, & in principiis accessionū refrigerātur, his artus fricare fortiter, & calefacere, cruraq; ac manus alligare, a vigilas cibiq; & potus omnimodam abstinentiā præcipere oportet. Optimum verò in his quid futurum sit præcognoscere, atq; hæc antè accessiōnem facere anticipare. Eos etiā qui ex siccitate in principiis accessiōnum defectū animi sunt incursum, optimum est præuidere. nā si duabus aut tribus horis antè accessiōnē exhibito cibo manus ac pedes constringi iusseris, nō interibunt. Oportet autem

rem cibos esse cōcoqui faciles & vētriculo
 aptos. Quòd si magnū imminere periculū
 fueris suspicatus, vinū dare anticipabis, vi-
 numq; præsertim in alicam elixatam infu-
 sum, quòd si aliquid panis alicæ vice exhi- *† In ant.*
 bueris, idē valebit. At si mediocriū animi *ἀέτον π*
 defectu expectatur, vino parcēdū, sed suffi *χόνδρου.*
 cit tūc mala punica, aut pira, aut mala aut a- *id est pa-*
 liquod aliud pomū quod vim habeat astringen- *nem ex a-*
 gendi. cibus admiscere, & si ad hæc medio- *lica.*
 criter tulerint accessione, quū rursus cibū
 obtuleris, nō erit necessariū ponis vti, hæc
 quidē facienda sunt si quid futurū præuide-
 ris. At qui ex inopinato in periculū incide-
 rint, vinū calidum & panis est exhibendus,
 & parum aliquid cū eo alicæ calidæ. Nam
 si his qui ita affecti sunt amplius obtuleris,
 aut cibos difficiles concoqui, nō modò de-
 fectum animæ patientur, verū etiam stran-
 gulabuntur. At qui animo deficiunt ex mē-
 bri toportuni obstructione, his oxymel da *ἰδιχαίρου*
 re oportet, atq; ex hyssopo, origano, pule- *id est præ-*
 gio, & melle potum, cibosq; incidēdi natu- *cipui.*
 ram habentes. Nam crassi ac tenaces, ma-
 gnas in talibus afferūt noxas. Sed neq; de-
 terius fuerit artus perfricare atq; alligare.
 Prodest etiam hisce potibus vti, qui vri-
 nam ciendi vim habent, veluti qui anetū, &
 feniculū, & apium & petroselinū, & ammi;

& daucum, & spicam nardi recipiunt. Quæ
vbi manifestè iuuerint, iam vino vtendum
est albo & tenui, non admodū antiquo. No-
tices verò huiuscemodi obstructiones, cum
ex aliis inæqualitatibus pulsuum, tū ex his
præcipuè quæ secundum magnitudinē, par-
uitatem, ac vehementiā, & debilitatē fiunt,
vbi humorum plenitudo non adiungatur.
nam & istius quoq; cōmunes sunt. fiunt ve-
rò & in huiuscemodi dispositionibus quum
vehementes fuerint, pulsus intercidentes.
hæc quidem in libris de pulsibus à nobis la-
tius explicantur. Nunc verò transgredia-
mur ad eum sermonem qui superest de reli-
quis exolutionibus: veluti quæ ex abscef-
sum disruptione aut sectione contingūt,
aut ex superflua euacuatiōe in his qui aquā
intercutem patiuntur. confestim quidem hi
optimis odoribus fouendi sunt. paulò pōst
autē sorbitionibus concoqui facilibus sunt
reficiendi. Si verò ob tristiciā aut gaudiū,
aut timorem, aut iram, aut terrorem exol-
uantur: odoribus, & nariū apprehensionibus
sunt reuocandi, cogendiq; ad vomitū. Eo-
dem pariter modo, qui ex vulneribus, aut
purgationibus, aut doloribus qui in articu-
lis, neruis, & musculorum chordis eueniūt,
exoluuntur, statim sunt ab eo affe ctu reuo-
candi. postmodū verò, conueniens passio-
ni

si cura est afferenda. Animi verò defectus qui intestini laxioris doloribus, aut ilei, aut similibus vehementibus cruciatibus fiunt, ex patientiū locorū cōcalescentionibus maximè, fricationibusq; extremorū præcipuè curantur. At quæ ex propria imbecillitate virium quæ regunt corpus, eveniunt exolutiones, ex intemperatura videlicet facta partium de quibus vires proficiuntur, contrariis curare intemperaturis oportet, frigidas quidem concalescentes, calidas verò refrigerantes: atque in aliis eadem ratione. Virtus igitur quā vitalem vocant, quam ex corde prodire ostēdimus, ex pulsum debilitate cognoscitur. At quæ ex hepate oritur, ac naturalis dicitur, ex sanguineis egestionibus ab initio aquosis atq; tenuibus, postmodū verò crassis ad modum fecis. At quæ ex cerebro originem ducit, quam præcipuè nōnulli animalem appellant, ex motuum voluntariorum imbecillitate deprehenditur. Sed de his quidem dispositionibus in alio tractatu separatim tibi scribemus. Multa enim in ipsis à medicis sunt prætermissa.

De cura capitis à variis causis molestati. Cap. XV.

QVoniā verò sermonē de accidētibus hucusq; perfecimus, rursus ad primū institutum redeamus, vñā in omnibus cō-

munem intentionem habentes, causas à quibus fiunt eorum singula considerare. hæ si quidem tibi conuenientem curationē ostendunt. Veluti si quis doleat caput, † si quidē *† εἰ μὴ α-σώδης εἶναι* [stomachus] & nauscam, & erosionem sentiat, iubendum est vt euomat. nam vel bilē *καὶ κατὰ* euomet, vel pituitam, vel vtrumq;. Quod *διώττοι* si quidē si nulla insignis appareat in ventriculo passibos fasti fio, cōsiderandum nunquid multitudo vel diat, & obstructio aut inflammatio aliquarum capitis partium adsit. Inuenies verò, primū quidē si interrogaueris nunquid dolor per totum caput extendatur aut alicui particula fortius insideat, deinde nunquid cū grauitate vel tēsiōe, & mordicatione, vel pulsu. nam qui cū grauitate dolores fiunt, multitudinem ostēdunt. qui autem cum mordicatione, vel vaporis, vel humoris acritudinem: cum pulsu verò, inflammationē, at cū tēsiōe, si quidem sine grauitate ac pulsu, spiritus crudi ac flatuosi multitudinem. Si verò cum pulsu, corporis membranosi inflammationem. at si grauitas adsit, multitudo intra membranas contenta significatur. Quum igitur omnia distinxeris, causam ex qua horum singula fiunt, considerare oportebit. illa enim tibi modum curationis ostēdet. Veluti si multitudo vaporis atque humoris contineatur, aduertere oportet nunquid

quid ob magnitudinē febriū humores dif-
fusi, ac veluti efferuescentes ad caput asce-
derint, aut propter eius partis imbecillita-
tem, aut ob totius corporis plenitudinem:
Hanc enim totius corporis euacuationibus
haud difficulter curaueris. Eū verò qui ex
partis imbecillitate cōtingit partim quidē
in contrarium trahendo per totum corpus,
partim ipsi parti remedia adhibendo. In cō-
trarium verò trahes clysteribus acribus, &
nexibus, & frictionibus in partibus inferio-
ribus plurimis: & si expedierit, aliquid etiā
sanguinis abducendo. Partem autē sanabis
eo tēpore quo ad vniuersum corpus retra-
his, his vtēs asperginibus quæ à capite vim
repellendi habent: ac deinde euacuantibus,
postremo verò corroborantibus. Repellit
autē oleū quod immaturū nominatur aut
tale aliquid simile, & quod oxyrhodinum
& rosaceum vocatur, ipsum per se ipsum, &
quæcūq; ex capitibus papaueris, & teneris
oliuæ germinibus, & hederæ corymbis, mē-
thaque viridi, & sisymbrio sunt. Utendum
verò ipsis, in multitudine quidē crudiore
ac frigidiore, tepidis: in calidiore autem &
biliosiore, frigidis. Euacuat autem, atq; dis-
soluit & oleum calidum ipsum per se ipsum,
magisque si antiquum fuerit & sicyonium,
aut anethum in ipso ebullierit. Nā multi-

D 5

rudo humorum qui non admodum sunt crassi atque tenaces sufficienter huiusmodi euacuatur. Sed & si spondylium, vel serpillum intus decoxeris, aut pulegij comam, vel calaminthæ, vel menthæ, vel sisymbrij, ita etiam id quod crassius est, euacuabis. hæc verò ipsa, virium etiam aliquid membris adiciunt & quæ debilia sunt roborant. Utendum verò ipsis deinceps usque ad integram sanitatis restitutionem: & si oportuerit, per nares etiam & palatum expurgandum. Sternutamenta etiam sunt excitanda. Et si ad balneas hominem induxeris, siccis sindonibus caput est perfricandum, salque, & nitrum, & sinapi sine oleo imponendum. Hæc quidem sunt ex particula debilitate, doloris capitis medicinæ. At quando ex magnitudine febrium accidit & medicamenta adhibere est necessarium, frigida qualitates ac vires, & quæ ex hydreleo, & oxyrhodino, & papaverum capitibus constant infusiones, expediunt. In dolore autem capitis qui sanguinis fluxum aut vomitum decretorium significat, non remedia querenda, neque enim accidens quoddam, sed bonum signum potius tale quicquam est existimandum. sicuti & multa alia quæ ante crises contingunt, quæ plurimis quidem terrorem incutiunt, bonum tamen quoddam ostendunt. Optimum verò posse digno

dignoscere ubi corpus perturbatur à natu * In gre.
 ra, cum ad alias excretiones, tum præsertim *impres. le.*
 ad vomitum, & sanguis fluxum molliente: *gitur ομο*
 quorum inseparabile indicium est capitis do- *χο μνοι.*
 lor. Diximus autem plenius de hisce omni- *in antiq.*
 bus alibi. Nunc verò quantum poterimus, *τυφο με-*
 primum seruantes institutum, breuiter de ipsis *νοι νιτα-*
 transigemus. Consideranda igitur, primum *que vox*
 quidem species febrium an calidæ sint an viæ *significat*
 res. Nā hæc per excretiones iudicari consue- *incidētes.*
 uerunt. quæadmodum quæ molliores sunt *† ita legi-*
 ac * summerse quodammodo diu durāt, & *tur i gre.*
 sapius feruntur in abscessus. Secundo loco, *si enim*
 an morbus sit ad salutem declinans. quis enim *principij,*
 bonam crisin in morbo pernicioso expecta- *vel augu-*
 uerit? Tercio ad hæc, totius morbi tempus *menti ad-*
 considerandum, vel enim in principio est, vel *est signū,*
 in augmento, quod si nodum affuerit status, *nodū autē*
 neq; coctionis signa in urinis, vel sputis, vel *status.*
 * abscessibus apparuerunt, non contingit bo * *Malè le-*
 nam fieri crisin. hæc sunt ex quibus spera- *gitur in*
 uerit quispiam, morbum per excretiones *græc. im-*
 crisin habiturum. Eius verò quod iam in- *pres. απο-*
 stat non amplius futurum est, hæc signa sunt. *συμμετρ,*
 Difficilis quædam tolerantia omnem cri- *pro απο-*
 sim antecedit. Et si quidem in die, crisis es- *πατημα-*
 se debet noctu: si autem noctu, in die. Si ta- *τερι. ex-*
 le aliquid videas, considerandum est quo- *crementis*
 tus sit ægritudinis dies. Quidam enim
 sunt

sunt qui ad crīsim apti sunt, paruo etiā motu à natura accepto. Multi verò in magnis motibus nequeunt omnino magnitudinem perturbationis inspicere nunquid sit secundū diei naturam. Nā septimus dies, etiā ex paruo naturę apparatus, ad crīsim p̄ euacuationē mouetur. Sexto verò magno apparatus indiget, & sæpe neq; vlla in eo sit crīsis, quod si fiat, neque sine periculo, neque fideliter accidit. Sic autem & vnicuiq; dierum aliorum quædam inest propria natura, quam, vbi de diebus decretoriis agitur, definiuimus. Age, iam sit dies pro magnitudine perturbationis deinde oportet considerare qualis erit crīsis. De aliis igitur nihil impræsentiarum dicere oportet. at si vomitus aut sanguinis fluxus ex naribus futurus est, nam huiusmodi crīsis vnū diximus esse signum dolorem capitis, ex his maxime distinguere oportet. Primum quidem si statim ab initio non inuat sicut quoddā ægritudinis accidens, sed ante crīsis perturbationem. deinde etiam si collum aliquid compatiatur, & præcordia retracta sint, aut anhelitus difficilis repētè superuenerit, thorace veluti intercluso. Si enim præter hæc pulsus in tumorem subitò elati non reciderint in paruitatem, neque debiles fuerint, statim crīsis expectāda est. si verò nō mo-

do

dò non deciderint, sed etiã in altum attol-
lantur, & vehementiã assumpserint, faciem
iam ægrotantis inspicere oportet. Nam si
quod in eo membrũ agitatur, aut venæ quę
sunt in tẽporibus pulsant aut malũ, vel na-
sus, vel oculus rubidior factus fuerit, magis
etiã crisis expectãda est. Si verò & inuiti la-
chrimati sint, aut splendores videre imagi-
nati fuerint, ac manus naribus admouerint
scalpẽtes, tũc nõ iam fluxurũ, sed iam fluen-
tem sanguinẽ inspicias. nã vbi semel aut bis
scalpserint, statim erũpit. Neq; verò ex his
perterrearis si hominem desipientem aut
resilientem inspexeris. Nam & hæc humo-
rum repentium ad partes superiores indi-
cia sunt: quemadmodum & anhelitus diffi-
cilis, & præcordia retracta, & collum simul
cum capite aggrauatum. At tibi vna cum
his indicio etiam sit desipiẽtia. Et hæc qui-
dem sufficere signa possunt. Sed accedit
quandoque & ægrotantis ætas, & natura,
quæ spem magis cõfirmat. ac præterea anni
tempus aërisque constitutio. Nam si ægro-
tus fuerit adolescens, aut alioquin natura
calidus, aut multo sanguine abundauerit,
magis adhuc de hoc sperandum erit. & si
etiã sapius antea dum sanus esset aut ægro-
taret, sanguis ex naribus fluere visus est,
hoc vel solum sufficit fluxus sanguinis spẽ
affe

afferre. Si verò & tempus anni æstas est, vel non est, sed tamen calidus præsens status, nonne ex his aliquam indicationē assume-
mus? Quod si & plures eo tempore crissim ex sanguinis fluxu habuerint, & hoc tibi spem vehementius augebit: & si corpus ple-
num extiterit, & consuetæ excretionēs fue-
rint retētæ. Mihi quidem neq; omnino vi-
detur difficile eū qui tot & talia habuerit
indicia, futuri sanguinis fluxus præcogno-
scere. At absurdum & magnæ imperitiæ est
non præcognoscere. Nostri verò temporis
medicorū negligētia ea admiratur, quæ ad-
miratione digna non sunt. Nā siue ex dex-
tra nare, siue ex sinistra fluxurus sit sanguis
nihil difficile ex nuper dictis agnoscere.
plures verò medicorum hoc non solum dif-
ficile, sed neq; omnino possibile existimāt.
& quidem has & alias excretionēs omnes
prænoscere licet. si hæc duo tantum consi-

† In Græc.
ἐσµη.

derauerimus, & vnde naturæ motus aga-
tur, & in quam partem. Nā & quæ deficiūt
adiuuabimus, & quæ immoderatè ferūtur
coercebimus, si ista nouerimus. veluti con-
festim sanguinis fluxus ex splene magnæ cu-
cubitæ sinistris præcordiis suppositæ faci-
lè retrahunt. At qui ex hepate prodeunt,
dextris: & qui ab aliis membris, eadem ra-
tione. Nā ex vno de omnibus colligere po-

ter

teris in vniuersum contemplando. Quare
 & ego hoc in loco præsentem finiam ser-
 monem. deinceps autem de febribus quæ
 ex inflammationibus accidunt tibi transi-
 gam, deq; aliis passionibus quæ in singulis
 partibus corporis constituuntur. Inflamma-
 tiones quidem à veteribus dicebantur ve-
 luti quædam exandescentia: à iunioribus
 autem non æquè. Neq; enim herpetas, neq;
 erysipelata, neque tale aliquid quicquam
 inflammationibus annumerant. Sed vni tã-
 tum affectui ex calidis qui fit cum tumore
 duro atque dolore †phlegmonoso, hoc no-
 men accommodant. non tamen ad hunc so-
 lum febres sequi videmus, sed ad omnes
 simpliciter calidas ac veluti effeue-
 scentes passionibus. De his igitur,
 atque aliis similibus morbis, sequenti li-
 bro verba faci-
 ciemus.

† Mendosè
 legitur in
 græc. cod.
 impressis
 φλεγμα-
 τώδους
 πρὸ σφο-
 δωτά-
 δους. i. pul-
 satili, vt
 legitur in
 manuscri-
 ptis.



GALENI DE

ARTE CVRATIVA


AD GLAVCONEM

LIBER II.

NICOLAO LEONI-

ceno interprete.

CAP. I.



E his autem quæ in singulis corporis partibus fiunt passiones Glauco deinceps dicemus, ab inflammatione incipientes. Etenim sæpius hæc fit, plurimasq;

habet differentias, ex quibus omnibus solent febres contingere. Communis igitur in omnibus, immoderata caliditas & velut quædam effervescentia. unde & inflammationis nomen de ipsis efferre antiqui consueverunt. Propriam autem quandam in singulis differentiam inuenies, ex qua eius speciem agnosces, & conuenientem assequeris medelam. Aliter enim qui herpes, aliter quæ erysipelata, atque aliter quæ phlygethla vocantur, ac reliquas inflammationis

† φλόγω-
σις.* φλεγμο-
νις.

nis species curabis. Itaq; hoc etiam in loco
 antecedit ea facultas qua possumus rectè
 cognoscere passiones. Tibiq; hoc primùm
 conabor scribere, omnes ab initio distin-
 guens inflātionū differentias Prima igitur
 inflāmatiōis differētia est secundū quā,
 hanc quidē humidam, hanc verò siccā esse
 contingit. Humidā quidē quæ ex calida flu-
 xione mēbrū occupante contingit. Siccam
 verò, quādo nullo humore influente calor
 naturalis efferuescit. Hoc autē vsq; ad ali-
 quid quidē veluti febris est membri: quum
 verò iam ad immoderatā caliditatē ac sic-
 citatē peruenerit, corruptio atque extin-
 ctio omnimoda fit. Quare neq; in plura se-
 cari potest, quēadmodum differentia alte-
 ra secundum quā quosdā influere humores
 particulæ dicebamus multæ enim sunt huius
 species. Nam fluente sanguine altera, flaua
 bile altera ambobusque simul humoribus,
 alia tertia. Et quidem in earū singulis vel
 iam putruit id quod influxit, aut in mēbro
 constructū putrescit: & vel crassum est, vel
 tenue vel optimū seu acre. Sanguine igitur
 optimo ac mediocrē crassitudinē obtinē-
 re, ad particulā aliquā affatim fluente; atq;
 ob multitudinē conculcato vehemens do-
 lor arripit hominem, nisi mēbrū sensum
 omnino hebetē habuerit: pulsusque in pro-

E.

fundo molestus accidit, tendiq; omnino ac
 frangi membrum apparet, & vehementem
 calorem per sentit, adeo vt comburi videa-
 tur, & refrigerari desiderat. Talisq; rubor
 per summa viget, qualis ex balneis adue-
 nit, aut ex igne, aut quouis alio modo cale-
 factis. Hæc quidē passio totius generis no-
 men accipit, atque inflammatio nominatur:
 sicut multæ aliæ species nomen generis ac-
 ci- piunt. Fitq; semper ex omni ferè occasio-
 ne. Nam & vulneribus, & distentionibus,
 & disruptionibus, & contusionibus, & scis-
 sionibus, & exercitandi laboribus, & exar-
 ticationibus, atque fracturis, & spontaneis
 ulceribus aduenit. Et præter hæc omnia,
 quando ad immoderatam humorum reple-
 tionem venæ per tingunt, tunc quod super-
 fluum est, effundit ad aliquam partē qua-
 cunq; eo tēpore recipere aptior sit. Omni-
 no autē, hæc reliquis omnibus est imbecil-
 lior, vel rarior, taut ad trahēdum paratior,
 vel * ignobilior, ex quacunque causā fuerit
 ad has perducta dispositiones. Neque enim
 de hoc dicere proposuimus. Flaua verò bi-
 lis quādo sui seruās naturā vnā cū sangui-
 ne per totum corpus defertur, morbum fa-
 cit qui * regius appellatur. Sola verò quan-
 do excernitur, & in aliquo mēbro cōsistit,
 herpes vocatur. Si quidē crassa sit secundū
 substan-

substantiam, totam exulcerat cutem vsque ad carnem suppositam. Atque hunc affectū Hippoc. nominat herpetem exedentem. Si verò tenuior fuerit, id quod in superficie est tantum veluti deurit, atque hæc species generis sortitū appellationē: quū simpliciter & sine additione herpes vocet. Nam ex duabus speciebus quæ quidem nuper dictæ sunt, altera herpes exedens nominatur, altera verò miliaris: quoniam in hoc affectu pustulæ parvæ ac multæ per summā cutem similes milio excitantur. Fit autem herpes huiusmodi etiam ex bile quidem, sed minus calida & acri quā sit prior. Quod si ex sanguine & flava bile calidiorib⁹ quā oporteat mixta fluxio fuerit, aut ex sanguine quidē, sed feruido ac substantia tenuissimo erysipelas hic affectus vocatur, multo inflā matione calidior, magisq; colorē flauū repræsentans. Et si tetigeris, facilè sanguis subterfugit: rursusq; illabitur, exquisitè tenuis & aspectu rubidus: nō tamē dolet hic veluti inflā matio, neq; vt aliqua inflā mationis species pulsū aut compressionem aut similem inuehit tensionem. Sed quandoq; valdè parum infestat, ac tum præsertim quando per solam cutem diffusum fuerit, nihil inferiorem carnē molestant. Et quidē tale sæpius accidit, atque hoc est ex-

ῥευματος
i. fluxiōe.

[non est
in græ.

quisitum erysipelas, quemadmodum quod attingit inferiorem carnē, id neque ex verē tenuibile consistit, neque tantum est erysipelas, sed iam dispositio permixta ex erysipelate atq; inflammatione. Exuperant autem in ipsa quandoque propria erysipelatis accidentia, atque hic affectus à iunioribus medicis erysipelas inflammationis participans nominatur. Nonnūquam verò inflammationis accidentia prævalent, & tunc ipsum nominant inflammationem erysipelatis participantem. Quod si neutrius accidentia manifestè obtinuerint, sed æqualia apparuerint: tunc erysipelas atque inflammatio misceri dicuntur. Exquisitum igitur erysipelas [tanquā] cutis solius passio est. non tamen ipsa inflammatio est partium tantum cuti subiectarum, sed harum quidem præcipuè, nonnūquam verò etiam cutis. & ipsa quidem dolorem non minorem affert quā altera, pulsus tamen ei deest. Quum verò sanguis influens calidus sufficienter extiterit & crassus, quodcūq; membrorum subito occupauerit, hoc combustio facit vlcus cum crusta, quicquid verò circumiacet in inflammationem eleuat effervescentem, & grauitè dolentem vocatur autē carbo huiuscemodi passio. Quum verò sanguis influens niger extiterit, crassusq;

susque, ac feculentus ac feruens, qualis quæ
 antea diximus, simul autē & † sanie quādā † *ἰχάρης*
 tenuē admixtā habuerit, pustulas per sum-
 ma cutis excitat, similes iis quæ ex igne
 fiunt: quibus disruptis crustosum sub ipsis
 vlcus inuenitur. Etiā hoc carbo est. Inflā-
 matio quidē in tot species secundū ipsam
 passionis naturam diuiditur. Multas verò
 quispiā prætermittas putaret deceptus mul-
 titudine nominū, veluti bubones, phyma-
 ta, phygethla, opthalmias, peripneumōias,
 pleuritidas, & multa alia similibus appella-
 tionibus dicta: hæc enim omnia inflamma-
 tiones quædam sunt in prioribus compre-
 hensæ speciebus. Singula verò diuersa sunt
 sortita nomina: quoniam qui primi ea
 imposuerunt, vno nomine, & passionis
 ipsius, & continentis ipsam particulæ
 compositum intellectum interpretari vo-
 luerunt. Sunt enim bubon, phyma, atque
 phygethlon, partium laxarum (quas ade-
 nas vocant) passionis: bubon quidem, in-
 flāmatio: phyma autem quod statim auge-
 tur atque ad suppurationē festinat. Phyge-
 thlō autē erysipelas particeps inflāmatiois,
 aut inflāmatio erysipelatis particeps, no-
 minatur. Sic autē & opthalmia, eius mem-
 branæ quæ corneæ inhæret, est inflamma-
 tio. Pleuritis autē, eius quæ lateribus sub-

†*de puy-*
709.

iacet. Synanchæ autē, † gutturis. Peripneumonia verò pulmonis: eademq; in singulis aliis ratione. Eas igitur quæ sunt in partibus apparentibus inflammationes, promptum est cognoscere. Quæ in occultis, & febres omnino afferunt, non æquè discernuntur. At mihi videtur mente egere perspicaci eiusmodi agnitio, ac præterea peritia naturæ membrorum, quam ex sectione simul & exquisita scientia operationumq; atq; vsuum cōparamus. De his quidē in aliis tractatibus diximus: nūc verò non datur de his sermonem adiungere, quando tibi repentē peregrinandi necessitas ingruat. Quo pacto verò quispiā eas maxime curat inflammationes quæ in apertis partibus cōstāt, hoc tibi primū transigo, principiū sumēs ab ea passione quæ plurimū fit, atque idcirco totius generis affert appellationem: in qua hoc imprimis considerandum existimo, quod & in aliis omnibus magnam vim habet, ut morbi causam inueniamus.

De causis inflammationum.

CAP. II.

Est igitur una quædam apparentiū inflammationum causa, quæ non admodum occulta est, quæ fluxio appellatur, nisi quādoque illis cōiungatur, quæ aliqua alia ex causa euidente factæ videntur. Quādo enim

enim nulla ex his præcedente, mēbrū confestim patitur inflammationem, ea quæ hanc passionē causa generat, fluxio vocatur, ipsa verò passio, dispositio fluxiōis. Oportetq; in his inflammationibus principia curationum optima fieri: nam quæ in ipsis errata contingunt, difficulter sanabiles aut omnino insanabiles faciunt dispositiones. Sunt autem hæc duo maximè errata, si nulla de toto corpore prouidentia habeatur, etsi calefiat atq; humedetur etiam membrū. Hæc verò duo medicorū pleriq; delinquant. Nonnulli quidē ex methodicis persuasi, & inflammationes omnes esse passiones astrictas existimantes, eas laxandas esse duxerunt. Sunt verò quidā qui sine ratione atque vlla consideratione istos sequuntur, vnā excusationem ad malè agendum habentes: nimirum cum multis delinquere. Sed neque ex dogmaticis medicis quispiam neque ex empiricis ita sensit. Sed quod & ratio & experientia suadet, totum quidem corpus euacuare quibuscunq; euacuationibus consulunt, ipsam verò inflammatam partem perfundere ac superlinire eis quæ id quod influit repellendi vim habent, id verò quod in membro patiente continetur euacuare: vim autem ac robur adiungere his quæ iam affectæ sunt

partibus. Ad quæ verò inspicientes oportet euacuare, iam & antea diximus: sed & nunc breuiter commemorabimus, ut insequentibus memoria seruata non sit necessarium in singulis passionibus, eas quæ euacuationes indicant audire intentiones. Aetatem igitur, & tempus anni, & re-
nem, & præsentem statum, & eius qui afficitur robur, habitumque; & consuetudinem, atque ipsam ægritudinis naturam, diximus considerandam. Ex his enim quod vacuandum aut non vacuandum sit, & unde, & quomodo inuenitur: veluti in ea de qua nunc agitur dispositione, ad genus fluxus deferatur, atque hoc subito plurimum attollatur, tibi verò totum corpus plenum sanguine appareat & valida laborantis vis, tempus autem anni sit ver, regio temperata: æger verò sit adolescens aut iuuenis, is sanguinis euacuatione ex superioribus partibus indiget: oportetque incidere eius in cubito venam, aut scilicet internam aut mediam. Si verò aliqua pars superior pateretur, per inferiora sanguis est educendus. Semper enim fluxionis motum ad contrarium trahere expedit: atque emplastrum apponere ex semperuiuo, & corticibus malorum punicorum in vino decoctis, & Rhu, & farina hordei compositum: hoc enim & in huiusmodi optimum est atque
ad

ad omnia quę facere intēdimus efficax. Repellit enim id quod influit: atque id quod continetur exiccat, & circūiacentia mēbra corroborat. Milleq; alia medicamina eodē modo cōponere licet, quorū cōpositionis viam ac modum in libris de medicaminibus didicisti. Vnde ego quoque in singulis vnū aliqd tibi subiiciā, futurū tibi & monumētū, & eius quę est in aliis facultatis exēplū. Si quidē non admodū doleāt, istis vtēdum est. Cum magno autem dolore fluxu incidente, non sic oportet neque aquā calidam, neq; oleū, neq; farinę triticeę cataplasmata offerre, hæc enim omnia fluxiōibus aduersantur, quamuis ab initio aliquid iuuare videātur. Sufficit aut in huiuscemodi affectibus vehementiā doloris mitigare cum aliquo ex his quod ex vino dulci, & oleo rosaceo, & pauca cera quę in vtroque †Male le-
 sit liquefacta conficitur. Oportet autē hæc *gitur in*
 lanis excipere pinguibus, quę plurimum *Græ. im-*
 †cēsyti habeant: & æstate quidem frigida, *pres. ὕσ-*
 hyeme autem tepida apponere. Sic etiam *σάπων* ρ
 cataplasmata ex arnoglossō, lente, pane, & *οἱ σάπων.*
 rosaceo oleo adhibere: paulō antē suprā *vide quę*
 patientes particulas apponere spongiā *vi- annotavi*
 no austero intinctā, aut aqua frigida. *Me- mus in li-*
 lius verò fuerit si parum aliquid aceti adiū- *bro 14.*
 gatur. Quod si hæc cura quidem insigniter *Meth. c. 7.*

*In anti. legitur. φαρμάκοις μαλθακοῖς. i. medicamentis mol-
libus non

μαλτα- profuerit, neque alicubi pus se ostenderit
κοῖς ἔμ. *emplastris mollibus ad fluxionē vtēdum.

πλάστοις Optima verò ex his sunt quæ exiccandi &
*διελόν- repellendi quod fluit sine dolore vim ha-

τα. bent quemadmodum ea quæ vehementer

†In Græ. intendunt, atque idcirco dolorem afferūt,

ἐστὶ τῶν plus doloribus obsunt, quam exiccando

τῶν ἄλλων proficiunt. Tale igitur oportet esse medi-

φαρμά- camen quale nobis in vsu est quod ex chal-

καρτι cite cōstat, remissum oleo rosaceo. Si verò

τῶν ἑμ. lanam mundam vino acerbo madefeceris

πλαστῶν. & apposueris, pl^o iuueris. Quod si pus se in

i. aliq^d ex particula ostenderit, cataplasma offerre

his medica oportet semel aut bis. Plus verò ad præ-

mētis quæ sens iuuat farina hordeacea. Adiungēdum

ēplastica tamen & his aliquid vel aceti vel vini. Et

appellan- *postquam secueris & pus euacuaueris, ca-

tur: de qui uendum est deinceps ne oleum aut aquam

bis vide imponas: at si quando vulnus abluere oportet,

apud Gal. mellicrato vel oxycrato & vino &

libro 4. de mulso vtendum. Superponendum verò, si

simp. med. adhuc inflammetur, ex lente cataplasma. Si

faculta. c. verò sine inflammatione fuerit, † aliquod

4. & 5. et ex his medicamentis quæ emplastri ritu

lib. 5. c. 10. applicantur, quibus in huiusmodi se-

ctionibus vti consueuimus, & præci-

puè id quod ex chalcite constat: apponen-

da

†Αἰπαινὴς τὰρ habetur in græ. quod & pinguibus, & oleo-
 sis, verti-
 da verò super hæc extrinsecus, spongia, poterat.
 aut lana vino acerbò persusa. Quòd si acer * In græ.
 bum non affuerit, tanto aceto aqua tempe est ἀποξη-
 randa est, vt adhuc potari possit, atq; hac ῥῆς, id est
 intingere oportet. Sunt verò & ad hoc op- in summa
 portuna, ea vina quæ aliquid aquæ marinæ cute scari
 recipiunt. Et tu quoque, vbi sit opportu- ficare, nec
 num, potes conficere permiscendo salem ei est quod
 vino quod penes te habes. Vulneri au- vbi hos tu
 tem, nullum ex medicamentis † quæ hu- mores ad
 mectant apponendum, quale est macedo- suppura-
 nicum, & quod tetrapharmacum nomina- tionem iē
 tur. Nam exquisitè exiccarè expedit. tamus du
 Ita quidem sanare oportet ex fluxione cere, eos
 inflammationes. Quæ verò alia ex causa incida-
 fiunt, humectare ac calefacere nihil pro- mus vide
 hibet. Et si ad suppurationem perducere Gal. in li.
 volueris, cataplasma ex farina triticea, quæ 13. Meth.
 in oleo atque aqua ebullierit apponen. cap. 3. &
 dum. Et si quādo * incidere oportuerit, ne- hic infra
 que hoc verendum est. Si verò eas quæ ex in cap. 7.
 fluxionibus fiunt inflammationes * secue. * ἀποξη-
 ris, magnū afferes malum, ac per initia præ- σαίς, id est
 fertim. Nam quæcunque ex ipsis longioris scarifica-
 temporis existētes, post totius corporis eua ueris
 cuationem, atque aliam opportunam cura-
 tionem, quasdam durities atque nigricies
 in

in mēbris habent derelictas, his sanguinem auferre nil prohibet, neq; enim amplius hæ in numero inflammationum habēdæ sunt, sicuti neq; erysipelatum, si quid iā liuidum sit. Etenim & hoc per initia quidē infrigidādum est, tūc præsertim quum sine manifesta occasione factū fuerit. Quando verò

† In græ. iam illi deerit feruor, & † incidere cōuenit, est *χάσας* atq; emplastrum ex farina hordeacea, * & *συμφεσι* ceratū & aliud aliquod medicamen ex di- id est sca- scutientibus apponendum, nō tamen ex verificare cō na in talibus sanguis necessariō mittendus ducit. est: sed ventrem tantummodo expurgare

* In græ. sufficit. dandū autē medicamen quod bilē additur flauam educat. Si verò passio parua fuerit, *εἰς μὲν*, id neq; hoc facere est necessarium, sed sufficit est calida. clystere acri uti. Quæ verò ex vlceribus sunt erysipelata, & quæcunque adeo manifestas causas habent, si statim volueris cataplasma apponere ex farina hordeacea, & præsertim si antea secueris, nihil nocebis.

† *πρὸς αὐτὸ* Inflammationibus verò quæ cum erysipe- *χάσας* late coniunctæ sunt & erysipelatis cum ingitur in flammatione, mixta quantum fieri potest, græ. i. an- curatio est adhibenda, semper quæ illi quod tea scarifi magis superat, resistendum. Et eorū quoq; caneris. quæ bubones, phymata, & phygethla à Græcis dicuntur, similem his quæ in aliis partibus similes accidunt dispositiones curatio

rationem oportet adhibere, præterquam in partibus quæ acriora medicamēta in eisdem affectibus possunt tolerare: quemadmodum sunt glandulæ, quas adenas vocāt. Herpetes autem, quantum ad totius corporis euacuationem attinet, vt erysipelata curare oportet. Quantum verò ad ipsius particulæ patientis locum, non omnibus similis cura adhibetur, nam qui exedētes sunt, refrigerari quidem desiderant, quemadmodum alij herpes & erysipelata: non tamē ea ferunt medicamenta quæ præter id quod refrigerant etiam humectare natura apta sunt, sed sola admittunt refrigerantia, quæ etiam maximè possunt exiccare. Non igitur lactucam, vel polygonum, neque ex stagnis lentem, aut palustrē lotum, vel anthyllion, vel psyllion, vel portulacam, vel serim, vel semperuiuū, vel tale aliquid quod refrigerare possit atque humectare, apponendum, quæ erysipelatibus erant opportuna. Neque vnquam spongiæ fidas frigida aqua perfusæ, neq; solano: quāuis refrigerandi atque vnā exiccandi vim habet, sed mediocrem, illi verò maiorem quā solano adsit, expetunt siccitatem. Superimponere igitur ipsis oportet, ab initio quidem ex vite capreolos, & folia rubi, & rubi canini, & arnoglossi. Post hæc verò
& len

¶ In vete- & lentem † adiungere oportet, & aliquan-
 ti græco do mel, & farinam hordeaceam, & quod
 codice le- antea scriptūmus ad inflammationes quæ
 gitur non ex fluxione eueniunt cataplasma, dempto
 μίγνυται ab eo semper uiuo. Ipsa verò loca exulcera-
 ta sed ta inunge medicamentis, quæ ad herpetas
 μίγνυται in libris qui pharmaceutici dicuntur, scri-
 ptæ sunt. Multa verò huiusmodi apud o-
 mnes inueniuntur. plurimaq; ex his ad figu-
 ram paruorum circulorum formantur, &
 si oporteat. vbi uti volueris, ex vino dulci liquefacere
 oportet. Quod si dulce non affuerit, tenui
 & albo & subaustero, quale est phalernū &
 massilioticum & sabinum & adrianū & ar-
 syinum, vtendum est. Cauendum tamen
 ne ob antiquitatem aliquam contraxerit in-
 gustu acritudinem, Et si posca aquosa vi-
 ce horum aliquando vsus fueris, nil dete-
 rius feceris. Iam verò in longum tempus
 protractis vlceribus, neq; dulci circuli par-
 ui sunt diluendi, neq; posca adhuc aquosa
 sit, & vina quæ sunt sufficienter austera cō-
 ueniunt, præcipuè verò nigra, & si ea non
 affuerint, alba. Medicamina autem in hoc
 tempore ipsis præcipuè sunt accommodata,
 & quod Polyidæ vocatur, & Pasionis &
 Musæ & Andronis, & quæcūq; alia his si-
 milia sunt. Herpetas verò qui summa tātū-
 modo exulcerant, nisi diu perdurauerint,
 nullo

nullo horum inungere oportet. † adurunt † *In anti.*
 enim fortiter & vehemēter exiccant. Verū *legitur nō*
 istis sufficiunt quæcunq; vim glaucij habēt *καὶ δὲ γὰρ*
 medicamenta, diluere autem maximè qui- *ἰατρῶν*
 dem aqua. Quòd si nil profecerit, etiā ace. *sed isti*
 tum adiungere oportet. Quòd si etiā sola- *γὰρ ἰσ-*
 ni succo intinxis aut arnoglossi, plus etiā *χυρὰ, id*
 proficies. Summatim verò hæc te cognosce *est fortia.*
 re oportet. quod omne vlcus siue spōte si- *.n. sunt.*
 ue ex casu siue ex percussione factū fuerit, † *μη πρὸς*
 exiccari desiderat medicamento (ut inquit *σκελῶ.*

Hippocrates) † non aspero, hoc est nō mor-
 dēte neq; vehementer irritante, præter quā
 vbi malignū & cū putrilagine fuerit. Talia
 enim acriora expetunt medicamina, & quæ
 ignis vires habent. quale est misy, & chalcī-
 tes, & arsenicū, & calx, & sandaracha. Et
 enim nō aliter quā ignis adurūt medicamē-
 ta huiuscemodi. Sæpius verò vbi ista celled-
 rint, ipsum ignem adhibemus. Eadem
 ratione, vocatis carbonibus, super ipsam
 crustam, vbi præcipuè membrum putre-
 fit, huiuscemodi medicamentorum est † *In græ.*
 natura conueniens, non tamē loca circum- *est ἀνός*
 iacentia tangere expedit, † ne te ipsum la- *γὰρ αὐτὸ.*
 teat, ea exulcerans quæ minimè expedit, id est si
 sed antedictis circulis paruis utēdū est, qua *quidē di-*
 lis est qui andronius nominatur. Si quando *solues il-*
 verò rubor inualuerit, & plurima inflam- *la.*

matio,

matio, medicamentum dulci est diluendū,
 vel arnoglōssi succo. Si verò magnus sit
 tumor, vino quidem acerbō in principio,
 postmodum verò & aceto. Cataplasma
 etiā ex orobi farina & oxymelle confe-
 ctum apponendum, atque antè hæc omnia
 statim ab initio tantum sanguinis auferen-
 dum quantū sufficit, nisi aliud prohibuerit.
 Hæc quidem sunt passionum per genera cu-
 rationes, quæ pro naturæ instrumentorum
 patientium varietate mutantur. Quatuor
 verò sunt ab his indicationes, ab eorum tē-
 peratura, à formatione, à situ & atque poten-
 tia. A temperatura, si nonnulla quidē ex
 ipsis natura sicciora sunt, nonnulla autem
 humidiora, quædam frigidiora, quædā ca-
 lidiora existunt, & secundum coniugatio-
 nem humidiora ac calidiora, † vel sicciora
 atq; frigidiora, aut ex toto tēperata. Opor-
 tetque in curationibus intentionē haberi
 ad membri naturam. Hæc enim quousque
 infrigidandum aut exiccandum sit docet.
 Nam si carnosæ partes inflammationē pa-
 tiuntur, paulum exiccandæ sunt, venosæ
 quoque quanuis sint carnosæ longè siccio-
 res, non tamen & ipsæ multū exiccari de-
 siderant. Sed quæcunque natura arteriosæ
 sunt, magis venosæ sunt exiccandæ, atq; his
 amplius, neruosæ, & multo magis cartila-
 gino.

† *ἰκτῆς*
ὑπερ-
σος: id est
 à partis
 facultate.
 † additur
 in græ.
 vel humi-
 diora &
 frigidio-
 ra, vel sic-
 ciora &
 calidiora.

ginosæ & ossæ. Nam prius quam ad propriam naturam particula redeat, nondū curationi impositum finem arbitrandum. Sicciores verò temperaturam inducunt quæ siccissima sunt: & frigidiorē, quæ frigidissima, & secundum alias qualitates eodem modo. Ad mediocrem verò habitum referūt, quæ sunt in vnaquaque mediocria. Sic quidem partium temperaturæ passionum variāt curationes. At formationes hoc modo. Nam quædam intra sese habent cavitates, quædam extrinsecus, quædam vtrobi- que, quædam neutra parte, velut ex simplicibus, arteriæ, ac venæ, & nerui: quæ quidē in artubus sunt, intra sese: quæ verò intra peritonæum, vtrinque. Nerui autem qui in artubus sunt, neutra parte, qui verò intra peritonæum, ex altera, visceribus autē ferē omnibus, intrinsecus atque extrinsecus sunt magnæ capacitates, ac præterea caro ipsa in pulmone quidem spongiosa, contra verò in trenibus densissima, & post hāc, hepatis caro. Splenis verò caro, quanto densior est ea quæ in pulmone, tanto illa quæ in hepate rarior. In omnibus igitur his quæ neutra ex parte cavitates & receptacula habent, defluxionis superfluitatē recipiētes fortiter exiccare oportet, & si nō fuerint natura sicciores, sicuti nerui, & præ-

†malè le-
gitur in
impres.
¶¶¶¶¶
pro ve-
¶¶¶¶¶

F

† In græ. cipuè† in membris supradictis. Sed quæ int.
 est τὰ ἐν- tus & extra aliquid inflammationis possunt
 τοῖς κώ- relaxare, non multū huiusmodi fortiter
 λοις, id est exiccantibus egent, si præsertim laxā carnē
 illi q̄ sunt habuerint, quæ admodū pulmo. At ex posi-
 in artub⁹ tu indicatio, neq; ipsa prætermittenda est.
 † ἡ ἀντι Nā per quæ euacuare oporteat, atq; quo-
 σπασις. modo, ipsa demonstrat. Fluentiū igitur ad-
 † ἡ πρὸ huc humorū, † retractio (sic enim Hippo-
 χρίτουσι. crates nominat) eorum aut qui iam mēbrū
 * ταῖς ip̄ obsederūt† deriuatio medela est. Vtrunq;
 ἰγνύσις. in autē euacuationis genus, per cōmunes ve-
 græ. habc- nas fieri præcipit, veluti eas quæ in matrici
 tur, quod bus, in cōtrarium trahes, si eā quæ in cubi-
 vertēdum to est secueris venā, aut mamillis cucurbi-
 erat, eis eas apposueris, vel manus cōcalesceris &
 quæ in po fricueris atq; alligaueris. Deriuabis autē si
 plitibus. * eas quæ in genibus, aut talis venas diuise
 † τὸ κατ' ris, & cucurbitulas coxis applicueris, & cru-
 ῖ σότυτα ra calesceris ac perfricueris atq; alligauē-
 habet in ris, & si quidē in parte dextra matricis pas-
 græ. quod sio fuerit, à dextra manu aut crure detraxe
 secundum ris sanguinem, si verò in sinistra, à membris
 equalita- quæ illi edirecto sunt. Quòdenim ab ipso
 teni verti κατ' ἵπ̄ dicitur, hoc ipsum est † secundum
 posset. rectitudinem. Interiores autem venas, inci-
 * τὸ ἰπ- dere oportet. * hæ enim viciniore, magis-
 ποικίλας quæ è directo sunt, patientibus mēbris. Nam
 quo! est si si lene inflammationem patiente sanguinē

vix

vis euacuare, interiores in manu sinistra *in impres.*
 venas secato, et si hepate, eadem ratione in *abundat.*
 dextra. Siquid verò ex superioribus infra *legendum*
 mationem habuerit veluti in his affectibus autē erat
 quos Græci synanchas, & ophthalmias vo. *in initio*
 cant, & quicunque alij capiti aduenerint, *lineæ ubi*
 eas quæ exte insecus sunt atque à directo. Si est *ὀπ' αὐ*
 autem artus patiantur, τὰ coniunctis eua- *τὸ.*

cuatio faciēda, siue retrahere velis, siue de- *τὰ πὸ τῶν*
 riuare. præterquam ubi passio sit inuetera- *ὀμοζύγας*
 ta, tunc enim à membro ipso patiente de- *τὰ ποχά-*
 trahimus. Sic igitur in synanchicis affecti- *ζομεν est*
 bus eas quæ sub lingua sunt venas incidi- *in grac.*
 mus, ubi iam totum corpus vacuum se no- *id est sca-*
 bis obtulerit, passio verò sit diuturna: sic *rificamus.*

& hepati & speni cucurbitulas applica-
 mus. Sic & aliud quodlibet patiens mem-
 brum τ incidimus, si non amplius humo-
 res influant (tunc enim magis irritaueris,
 ac, malum duplicaueris) sed quando iam
 totum corpus expurgatum fuerit, neque
 iam aliquid influit, aliquid verò quod
 pridem influxerat, in membro contine-
 tur. Et quidem laborantibus conuexis he-
 patis partibus quod per vrinam trahere
 oporteat, concavis autem, per excretionem
 inferiorē, situs ipsæ visceris indicat. Atque
 etiā thoracem & pulmonem per tusses ex-
 purgare. Ventriculum autē & stomachum

per vomitus. Intestina autem per inferiores excretiones, quemadmodum & splenē & renes per vrinas, matricem autem per menstrua, cerebrum autē atque eius membranas, per palatum & gargareonē, & nares, & aures. Sed quod & his quæ in superficie sunt partibus talia medicamēta apponere oporteat qualibus eget passio: atque iis quæ in profundo sunt, & quas per multa interposita debent eorum virtutes attingere: non qualia nunc sint, sed qualia futura sint, ex situ membrorum agnoscimus. Quare siue medicamētum est ex his quæ extrinsecus apponuntur, siue ex his quæ comeduntur, aut bibuntur, non præsens eius vis considerata est, sed ea quæ ad membrum affectum sit peruentura, hæc igitur quæcunq; in pulmonis inflammationibus, extrinsecus thoraci applicantur medicamenta, multo fortiora atque acriora natura sunt quàm si ipsa membro patienti apponerētur, quod enim per multorum corporum media ad membrum patiens peruenit, omnino exolutum est: & viribus defecit, si ab initio fuerit imbecille. Tantum igitur aduentitij roboris adiungere oportet, quantū in transitu amittitur, vt quod relinquitur, æquale remaneat ei quod tactu iuuat. Ob id igitur in thoracis inflammationibus quæ in superficie

ficie consistunt, ea quæ solū laxare possunt
sufficiunt, intrinsecus autem, sicut in mem-
brana succingente, acriora sunt necessaria.
Et de splene etiā atq; hepate omnibusque
visceribus intrinsecis ratio eadem. Sapius
enim ex, medicamentis impositis vlceratur
cutis, quanuis durior minusque ad patien-
dum habilis quam viscera. Et si ipsis visceri-
bus medicamenta applicare possemus, qui-
bus frequenter indigent, tātō molliora es-
se oporteret, quanto & ipsorum natura fa-
ciliior affici. Et quidem omnia quæ comede-
re & bibere iubent medicamenta viscerum
passionibus conferentia, hæc multo acrio-
ra ac potentiora viribus esse cōuenit, quā
hæc quibus indigent membra morbis affe-
cta, exceptis illis quæ & ventriculo & sto-
macho auxiliātur. Hæc enim sola talia ex-
hibentur, qualia à passionibus exiguntur.
Reliqua verò omnia, acriora ac fortiora
sunt, & præsertim quæ vel renum vel pul-
monis occasione dantur. Cōsidera itaque
quot numero partes pertiāfire oportet id
medicamē quod ad pulmonē sit peruēturū:
primū quidē, os, & fauces, & stomachum:
deinde & ipsum ventriculum, & quædam
ex tenuioribus intestinis, deinde eas quæ
sunt in mesenterio venas: deinde eas quæ
in finis partibus hepatis, ex quibus ad eas

quæ in conuexis transumptum. hinc ad
concauam peruenit venam: post quam ad
cor: deinceps hoc modo ad pulmonem. Ne-
que negare possumus quin in singulis par-
tibus his, quibusdam admisceatur humori-
bus, ac quandam transmutationem atque
alterationem pro natura visceris capiat.
Quare quod de eius virtute relinquatur,
minus omnino est, atque imbecillius quàm
vt membrum affectum iuuare possit. Quæ
igitur à situ partium indicatio sumitur in
tantum curationem euariat: quæ verò à
virtute quantum nunc dicturus sum. Quo-
niam ex partibus corporis nonnullæ ab in-
fluentibus virtutibus gubernantur, quædā
verò à propriis atque natiuis: atque ex his
ipsis, quædam sibiipsis duntaxat, quædam
etiam aliis fons & origo sunt virtutum: &
aliæ quidem opus habent peculiare, aliæ
autem commune: permutare opus est cura-
tionis formam pro ratione earum, quas di-
ximus, differentiarum. Nam pleraque ex
his remediis quæ antea memorauimus, mor-
bum quidem finiunt: sed natiuas membro-
rum virtutes offendunt. quæ quidem offen-
sio ad totum peruenit corpus. quod dupli-
citer fit, quatenus & membrum est alicuius
virtutis origo omnibus partibus commu-
nicata, aut ipsius opus toti corpori vtile
est.

est. Hepar enim, cor, cerebrum & testes, cōmuniter vniuerso corpori principia sunt virtutum. Ventriculo quidē atque matrici propriae insunt virtutes nulli alteri parti communes. Opus verò ventris quidem toti corpori confert, matricis autem nequaquam. Nocet autem sapius passionis curatio membri patientis virtuti. Quæ enim immoderatæ laxant, soluunt robur: quare & membri virtutem. Quæ autem supra modum refrigerant, natium calorem extinguunt, qui fortassis (vt nōnulli arbitrantur philosophi ac medici summi) substantia virtutum existit. Et si non hoc, saltem primū & maximè necessarium ipsorum instrumentum. Iam verò & qualitates quadā extraneæ, virtutes dissoluere possunt. Nihil igitur horum in curationibus præterire oportet, ne nosmetipsos fallamus in eum incidentes sermonem: Morbus quidem curatus est, homo autem obiit, quod à quamplurimis quotidie facitari vides, qui irrationalem experientiam profitentur, atq; hæresim methodicam, omnia artis bona destruentem, aut sermones aliquos dogmaticos quidem, sed multis erroribus plenos consecrantur. In indicatione autem quæ habetur ex virtute partium, quispiam etiam reponeret & facilitatem & difficultatē ad

sentiendum. Nam quæ facilè sentiunt, acris
 medicamenta non tolerant, sicuti neq; etiã
 humores. nam quum acris humor in ventri-
 culi ore continetur, sæpius animi defectum
 patiuntur. Quod si mediocris sit affectus,
 anxietatem & nauseam habet. nonnunquã
 humorem quo infestantur euomunt, non-
 nunquam verò frustra agitantur. Hocq; in
 illis affectibus accidit, in quibus in ore ven-
 triculi vitiatum humor imbibitur. eodẽ pa-
 riter modo, quum ad oculos huiusmodi hu-
 mor defluerit, maximum affert dolorẽ: &
 pustulas vlcerosas, & quæ difficulter curã
 recipiunt, excitat. Sic quoque rursus, oculi
 ipsi ob eam quam habent ad patiendum fa-
 cilitatem, tolerare non possunt acrium me-
 dicamentorum commercium. quemadmodũ
 neque etiam ventriculi os: neque etiam ali-
 quod extrinsecus aggrauans hæ particulæ
 tolerant: & magis ventriculo oculus, qui
 nonnunquã etiam ab his quæ inũgũtur mo-
 lestatur. At quæ sensum obtusum habent,
 hæc cataplasmata grauiã sustinent & medi-
 camenta mordacia. Si quis igitur velit ex
 facilitate sentiendi indicationẽ illis quatuor
 quas antea memorauimus, quintam annu-
 merare, vel in ea comprehendere quæ ex
 virtute sumitur, nihil quãtum ad rectè me-
 dicandum differt. Has igitur omnes indi-

cat

† δὲ τὴν
 ἐν τῷ
 στόματι.

† βαρύν-
 ται. i. ag-
 gravantur.

cationes memoria habere oportet in quacunque particula morbo aliquo affecta. nã & ipsius temperatura & formatio, & situs, & virtutes, eas quę in nobis fiunt operationes commutant, communi intentione seruata: quam quidem ex morbo semper assumendam esse docuimus. Qui igitur secundum solam & simplicem intemperiem morbi fiunt, per contrarias qualitates curantur. Calida quidem intemperies, per refrigerantia: siue primo siue ex accidenti refrigeret. frigida verò per calefacientia: sic sicca per humectantia, humida autem per exiccantia. De eo verò quod primo calefacit aut ex accidenti, plenè (vt nosti) diximus in eo tractatu quem de simplicium medicamentorum potestate composuimus. vbi id quod primò frigidum est, quandoque ex accidenti calefacere ostendimus: quemadmodũ aque frigida infusionem, vbi caloris naturalis fecerit reuocationem, & calidum refrigerare, quum rarefaciendo corpus, caliditatem fecerit euaporare. Quę igitur secundum solas actiuas qualitates corporis sunt alterationes, ex sola quę ex calefacientibus, refrigerantibus, humectantibus, atque exiccantibus potestate adhibetur, ad naturalẽ habitum restituuntur, neque sensibili egent euacuatione. Quę verò ob materiae influ-

F 5

xum si quidem bene temperata fuerint, solam evacuationem desiderant. Si verò vitiosa, evacuationem, atque vnaper contrarias qualitates expetunt alterationē. vacationis quidem veluti qui reumatici dicuntur affectus. de quibus (vt nosti) vnum à nobis volumen est additum, in quo & hoc statim ab initio ostensum est, quòd ea quæ totum corpus alit facultate laborante, huiusmodi sunt dispositiones, quum acervata superfluitas ad partes præcipuè defluat imbecilles. Si enim per reumaticam dispositionem sanguis qui in huiusmodi partes fluat fuerit vitiosus, mixta oritur dispositio: quod fortè rarissimè evenit. Sanguis enim sine pituita aut flava vel atra bile fluens, tenuis substantiæ mihi semper apparuit. Ex alia autem quapiam causa si pars intumeat, considerandum est an huiusmodi affectus sit inflammatio, an scirrhus, an œdema. Nos enim omnem calidam ac veluti flammeam dispositionem nominamus inflammationem, cuius differentias paulò ante diximus. Tempus itaque est vt de œdemate quam breuissimè moneamus, vt memineris eorum quæ per digressionem nos dicere audiuisti.

De œdemate.

Cap. I I I.

Oede

OEdema autem vocamus tumorem mollem doloris expertem, quem ex pituitosa substantia aut spiritu vaporoso fieri constat, qualis in cadaueribus euenit. Nonnunquam etiam in pedibus & cruribus eorum quos aqua inter cutem vexat, & in tabidis & aliis qui malo habitu (Græci κατὰ φύσιν vocant) laborant. Verū tale œdema in periculosis illis dispositionibus accidens est, nulla propria præcipuaque curatione indigens. Sola enim frictio ex oxyrhodino aut nonnunquam ex sale & oleo, vel etiam ex sale iniectis oxyrhodino, sistit ipsum, aliaque huiusmodi multa. quum verò propter pituitam parti influxam huiusmodi sit affectus, spongia in aqua quæ parum aceti habuerit rigata, passionem sedat. Si verò non quieuerit, paulo plus aceti miscendum est. Si tamen moderata ipsius temperatura, ut possit ipsam quispiam bibere. Quæ autem plus aquæ quam hac continet, in principio adhibenda est, maximè laxis corporibus. quæ verò fortior fuerit, virilibus corporibus & duram habentibus pellem, & quæ ad primam spongiæ appositionem non iuuantur. Oportet autem spongiam omnino nouam esse, quæ si non affuerit, saltem exquisitè abluta sit.

fit aphronitro & nitro, & lixiuio. Quod si ex his œdema nō quiescat, aluminis parum imponendū est, spōgiaq; omnino noua applicetur. Si verò in aliquo artuum tale fuerit œdema, incipiendo ligaturā in imis partibus, finire oportet in altioribus: iniectionem & compressionem & vniuersam distributionem facientes velut in fractionibus. Curationis enim intentio in huiusmodi affectibus mixta est vna quidē vt eorū substantia dissoluatur, alia ad aliquid congregandum & restringendum. Si igitur per ea quæ dicta sunt non sedetur, tūc aliquid fortiorum medicamentorum, quod temperaturam admixtam habeat ex dictis potestatibus adiiciendū est. Ego in diuturno œdema vbi partem oleo illinissem, spongiāq; ex lixiuio apposuissem, atque vehementius strinxissem, affectum perfectē curatum vidi, etiam hac viuendi regula non habente mixtam virium contemplationem, sed ad discutiendum & incidendum declinante, id quod in omnibus ferè diuturnis affectibus probatum haberi non ignoramus. Postquā verò satis ad te de œdematis scripsimus de duris deinceps tumoribus dicendum est.

De scirrho. Cap. II II.

EXquisitus scirrhus, est tumor præter naturam insensatus durusq;. Non ex-
qui

quisitus verò, non omnino insensibilis est, difficulter tamen omnino sentitur. Scirrhus igitur insensibilis curam non recipit. Qui verò difficulter sentitur, nec incurabilis est, nec facilem curationem admittit. Fit autem ex humore lento & crasso vix solubiliter induratis partibus infixio. Interdum itaque statim à principio congregatur paulatim & augetur. Crebrius verò medicorū imperitia paratur, cum vehementer erysipelata & inflammationes astringunt & in-frigidant. Si quis igitur medicamenta vehementer dissolutiva induratis corporibus adhibuerit, quæ manifestam faciant scirrhī diminutionem, breui tempore nō verè sperauerit perfectam curationem, nempe ignorans quod residuum passionis hoc curationis modo incurabile redditur. tenuior enim e: dissoluto humore, residuū exiccatum lapidis duritiem consequitur. Non igitur curandæ sunt partes induratæ medicamento immodicè siccante, sed cū eo quod calorem habeat tepidum, humiditatem verò nec multam, nec omnino minimā. quod enim superfluum humorem habet, nihil omnino dissoluit. quod verò minimum, plus quàm oportet exiccat. Oportet autem induratum corpus à medicamento quod auxilium futurum sit, simile quid pati his quæ
sub

sub sole funduntur. Vocantur autem mol-
 lificantia huiusmodi medicamenta: de qui-
 bus amplius diximus in quinto tractatu li-
 bri, qui de simplicium medicamentorum vi-
 ribus inscribitur. Exempla quoque (vt di-
 ctum est) ex simplicibus sunt omnes medul-
 lae atque adipēs. Ex medullis primas partes
 obtinet ceruina, deinde vitulina. Ex adipi-
 bus autem adeps anseris, in volucrum: leo-
 nis verò, in pedestrium animalium genere
 ceteris praestat. qui verò ex gallina sumi-
 tur, anserinum, & qui ex pardo, leoninū se-
 quitur, ac denique vrsinum atque taurinū.
 qui verò ex capris accipitur, & crassior &
 siccior praedictis est, idque magis si ab hir-
 co capiatur. At iam dictum est quòd huius-
 modi affectus medicamentis vehementer
 siccantibus non indiget. De differentia ve-
 rò quæ ex eorum tenuitate crassitudineq;
 oritur, & indicatiuè quidem dictum est: ma-
 nifestè verò nequaquam adhuc. Idcirco in
 memoriam tibi reuocanda sunt quæ inuicē
 cōmentabamur, quomodo Cercylii pue-
 rulum curabam, cui ex erysipelate nimis in-
 frigidato atque astricto, tumor durus in to-
 to femore relinquebatur. Existimauimus e-
 nim medicamenta quæ ipsum curare debe-
 rēt, tenuia esse oportere. quare femur oleo
 fouebā, in profundā peluim posito puero,
 quæ

† in δ & κ τ ι -
 x α γ.

quæ multū Sabini olei continebat, eo quod
 omnium tenuissimum ipsum esse sciebam.
 Balneo verò nisi pluribus interiectis die-
 bus, curandi totius corporis gratia prohi-
 bebam. Postquā verò partem fouimus, me-
 dicamenta ex prædictis medullis & adipi-
 bus confecta adhibuimus, miscēdo nonnun-
 quā bdellium scythicū, masticem agy-
 ptiam, atque ammoniacum thymiana vo-
 catum, quod pingue & non vetustum esset,
 similiter & chalbanū. Et postquā per hæc
 præparatum fuerat, soluto ammoniaco pin-
 guissimo in acerrimo aceto, circūlinito tū
 femur. Deinde per aliquot dies rursus opo-
 panacem multæ pinguedinis miscui aceto
 acerrimo, & huius videlicet exoluens id
 quod recēs erat. alioquin pingue nō perma-
 neret, quemadmodum nec bdelliū, nec am-
 moniacum neq; etiā chalbanū. Iussi q; pue-
 rum in altero crure stare, vt plus cibi ad il-
 lud ferretur. Rursus vt resederat iam tu-
 mor scirrhusus, timēs ne eius residuum ma-
 norū, quā-
 neret, omnia econtrariō facere aggressus do-
 vni in-
 sum, femur * ex resinaceo aliquo medicamē-
 nitētes pe-
 to perūgēs. Manifesto itaq; clarebat quod di-
 saltāt.
 ex aceto linimenta egregiē tumore commi-
 * τινι τῶν
 nuerāt: laxatiua autē molliorē reddiderūt, πικρῶ
 minorē autē nequaquā. vicissim tamen eis τῶν φαρ-
 vtēdo, adhibito convenienti moderamine, μακρῶ
 pue

* ἀπνευρώσεις. i. nervosis musculorum propagines.

† διακινεῖν. i. permovere.

* Ita legitur in græ. cod. impf. & manuscriptis πολλὰ γὰρ ἢ διὰ τελεῖας ἡγκυλωμένα τε καὶ κεκυλωμένα διὰ τὸ τοῦ τοῦ τρέπου τῆς θεραπείας, ἢ αὐτῶ τῶ διακινεῖν ἰεραπεύθην τελεῖας. i.

multæ e- puerulum curavi: sicut si altero duntaxat nim ptes medicamentorū genere quis curam attētas iam planè set, nihil ad scirrhi solutionē profecisset. In curuata, tēdonibus verò (voco autē sic *eneruatio- & mutila ues musculorū) ex prædictorū medicamen- te hoc mo torū vfu manifestissima auxilia videri licet, do curatio si quis rectè vtatur curatiōe ex pyrite lapi- nis, in ipsa de. Atq; oportet eū quū igne excanduerit, mēbri per acerrimo aceto aspergere, ac deinde super motiōe ita lapidem† mouere partem affectam, vt à va- pfeclē cu- pore sursum lato scirrhus dissoluatur.

rata sunt. * Multi enim hoc modo curationis perfe- In aliis co ctē sanati sunt, vt ferè magicum opus vi- dicibus le deretur. At oportet præparare mollificādo gitur non partem indurata, medicamētis de quibus κεκυλω- suprā diximus. Etiamnum in hac ipsa quæ μενδ, sed fit per pyritem lapidem curatione, subinde κεκυλω- multum oleum* Sabinum prius perfunden- μενδ. i. cō.

uolutæ. Quo pacto autem ex scirrho artus occupante mēbræ incurua fiant, illi norunt qui alias etiam subinde vident egritudines.

* In impres. additur θερμῶ. i. calidū, sed in ant. nō habetur. dum

dum est, aut aliud quod extenuandi vim habeat. Nec minus proderit anethi comā decoquere, præsertim quū viridis fuerit atque recens. Quod si pyritem habere non possis, molari utendum est. Vocant autem sic lapidem ex quo molæ parantur quæ frumentum molunt.

De splene indurato. CAP. V.

Splenē induratū non solū de foris fortibus medicamentis curare conuenit, sed & fortissimis potionibus: nam eas sine molestia tolerat. Ex quorū numero primas partes sibi vēdicant cortices radicum capparis, & scolopendrij, & myricæ, tum radix, tum germina omnibus huiusmodi in aceto & oxymelite coctis. At sæpenumero quū tangitur splen resistere videtur: non tamē ^{τοξικὸν} durus, sed flatuosus potius est tumor, in quo ^{δυσ-} oportet absynthio quum prius madefeceris ^{* ἀλὰ καὶ} medicamen emplasticum mixtas vires con- ^{τῶ ποσῶ} tinens superponere, quale est quod ex sulfure atque alumine constat. Sunt denique ^{τῆς μι-} multa huiusmodi in medicamentorum tractatibus ^{ἔως id est} descripta. Non simpliciter autem ^{sed ex} mixtorum medicamentorum viribus attendendum est, ^{quātitati} sed & quantū miscetur. Quū ^{eorum ex} quibus ^{corum ex} itaque splen flatuoso tumore afficitur, vel ^{xtio con-} magis oedemate, si multum aluminis adhi- ^{stat.}

*In Gra. bueris, nihil nocebis. *in duris autē tumori
legitur in bus vim †dissolutiuam superare conuenit:
indurato parum autem eius quod stringendi vim ha
aut liene. bet admiscendum est. Quum igitur de nu-
†διαφο. mero simplicium & sponte nascentiū medi
εντιξορ. camentorum flos salis tali sit natura prædi-
i disentiē tus sanat splenes induratos si extrinsecus
tem. ipsis in vesica apponatur. Scirrhum autē he-
*In im- patis ab initio quidem sanauimus sapius,
pres. est ubi verò ad plures dies fortè foret exten-
is ἀπ' αὐ- sus, neque ipse potui sanare, neque aliū vidi
τος, id est qui posset. Omnibus igitur qui ita affecti
omnino. lo sunt *ex necessitate subsequitur aqua in-
cus aut nō tercutem percunt autem quāplurimi in tē-
videtur pore longo. Quosdam verò noui etiā bre-
corruptus ui periisse qui magno ventris profluuiio la-
ut nota- borabant. Liquet igitur quod his sufficien-
tur in Al- ter *compressa erant ora vasorum per quæ
dino. transmittitur cibus ex finis hepatis parti-
*ιστιγ- bus in conuexas: adeo quod si quis ex eis sa-
uore. nati sunt ea quam antea diximus in muscu-
losarum partium scirrhis, curationis ratio
seruauit. Neque enim perfert hoc mēbrum
fortia medicamenta, veluti splen. Augere
autem oportet ea quæ ratione inflāmati-
onis illius apponuntur in mixtura emollien-
tium. Erant autem illa ex absinthij coma,
& expressione myrobalani, & vtraq; nardo
indica ac celtica. Adhuc autem & croco

&

In imp̃s. malè legitur ἐκφράσαι, pro ἐκφράσαι, sed in ant. est ἐκφρα.

& cœpanthe, & mastiche chia, & vnguentis *ἐκφράσαι. i.*
 quæ ex spica nardi conficiuntur. Adhuc au. *ad dissol-*
 tem mastichino & melino & cœnāthino. His *pandum.*
 igitur ammoniacum thymiana, & bdelliū ** In imp̃s.*
 & quas diximus medullæ, & adipēs mixti, *leg. διαφ-*
 & quæ incidere possunt, factum in hepate *ἐκφράσαι, in*
 scirrhum sanare poterunt: etiam ratio con. *anti. δια-*
 ueniens victus adhibeatur vna cum medi. *ἐκφράσαι. i.*
 camentis quæ in potu sumuntur, ad t̃ape. *dissoluen-*
 riendum* abstergendumque eum qui in vi. *dū, in alio*
 scere continetur humorem. Sunt verò hæc *verò vetu-*
 omnia etiam eos qui in renibus continetur *stiore cod.*
 lapides comminuere apta: de quorum mate *legitur*
 ria multi medici conscripserunt. Admisce. *διαφρασε-*
 re autem oportet & ex his quæ vrinam mo. *σαι. i. dissol-*
 uere possunt aliquid. Plurima verò est etiā *cutiedum.*
 istorum materia quæ à multis quidem scri. ** In imp̃s.*
 pta est, atque à nobis comprehensa in eo *est αἰθε-*
 quem de medicamentis scripsimus tracta. *εἶδος in*
 tu. Quare nunc etiam quæ dicta sunt tibi *ant. αἰθε-*
 sufficiant. Tempus enim est transgredi ad *εἶδος, id est*
 alterum tumoris genus, cui materia gene. *aëreus.*
 rationis est spiritus flatuosus. Vocatur au.
 tem non solum flatuosus, sed etiam flatus
 huiuscemodi spiritus, crassus & vaporosus
 existens non secundum substantiam * æthe-

† In impres. habetur συμπάσεται in ant. συμπάσας.

* διαπνέσσει. i. defletur.

† male legitur in impres.

* περιτοναίσις, pro περιτοναί.

* ita legi-

tur in gra reus neque tenuis. Cogita verò eius natu-
cis compre ram ex circūstāte nos aëre, in memoriā re-
hēditur uocans qualis in austrinis flatibus, qualis ve-
rò ali- in aquilonaribus: austrino enim aëri similis
quādo in- est flatus spiritus: aquilonio aut is qui in
tra mem- nobis secundum naturā est spiritus: † cōfert
branas aut ne huiusmodi spiritus * efflet, etiā dē-

[quæ mu fitas corporum. Quare huiusmodi affectus
sculos cō- curatio, cōmunem habebit intentionem ad
plectun- laxanda ea quæ astricta sunt corpora, atq;
tur] sicuti ad crassos spiritus extenuandos. Nam si cū
et intra subtiliori substantia sufficienter calefeca-
mēbrano- ris, id quidem quod densatum est rarefa-
sos tendo- cies, quod verò crassius est effectum exte-
nes. nuabis. Patientiū autem particularū natu-

[ibi autē ra, conuenientē auxiliorum materiā coindi-
ita habēt cabit, ac in ipsa maioris minorisq; ratio-
antiqui. s. nem. Nam spiritus iste crassus & vaporosus
quæ mu- nonnunquam * sub membranis quæ integūt
sculos aut ossa comprehenditur: nonnunquā verò sub
tendones peritonæo: aliquādo intra intestina vel vē-
complectū trē comprehenditur verò aliquando à tē-
tur. donibus membranosis, quæ musculos com-

plectuntur. Cōprehenditur etiā ab his quæ
ratione

rōne cognoscunt spatii in musculis, atque
 aliis partib⁹ corporis, quorū locorū naturā
 in tractatib⁹ de sectionibus didicisti. Ita igitur
 ipse musculus inflatur, atq; in vētris vel
 intestinorum corpore flatuosus includitur
 spiritus, & quū sufficiēter frigidus fuerit,
 tunc maximum dolorē excitat. Communis
 autem curatio omnibus est (quēadmodum
 diximus) per subtiliorem substantiam. Et
 quando passio dolorem habet adiunctum,
 talem habentem naturā, vt dolorem talem *ἡ θύλη
 queat mitigare: secundum patientiū partiū τῆς θερμότη-
 differentiā* substantia cōmutatur, & inten πείας.
 ditur atque obtunditur vis. Quum igitur i. materia
 ex tali spiritu dolor interuenerit in ventre etiā cura-
 inferiore, subtile oleum per ima, cum me- tionis.
 dicamentis quæ in ipso ebullierint, per cly- † Id autē
 sterē iniiciens, statim dolorē sedabis. Quæ est sison
 verò debent ebullire in oleo medicamenta apud Diosc.
 cum partium subtilitate calefacientia, sint li. 3. & si-
 cyminiū, & id quod apud nos est, ac potius non apud
 id quod æthiopicum nominatur, & apij & Pau. li. 7.
 petroselini semen, & marathri, & † sinonis, statim post
 anetique, atque libystici, & seseleos, & dau ca. de sil-
 ci, & spondilij: & si coniectura comprehen- phio et si
 deris frigidam esse dolentium partiū dispo in Gra. im
 sitionem, rutam & marathrū & grana lau- pres. ea
 ri intus decoques, miscebisque asphaltum, pars desi-
 ipsumque oleum laurinum, & si qua sunt deratur.

quæ eodem modo calefaciant. Quod si inflammationem huiusmodi doloribus adiunctam putaueris, auferes ea quæ admodum acia sunt, & quæ vehementius calefacient. Ad ea autem quæ in hoc mediocrem naturam gerunt transibis quæ vini laxandi habent. In oleo itaque concoques anethum non rutam: quibus etiam admiscebis adipem anserinum vel gallinaceum. Sed hæc quidem ubi vehementiores dolores infestant. Mediocres verò etiam extrinseca concalfactione iuuantur, ea præcipuè quæ ex miliis fit. Nam eorum leuitas dolentibus omnino sine molestia est. Si hæc non affuerint, vel ex sale calefacto, vel ex lini semine crudo, vel quocunque alio modo. Cucurbita etiam magna, cum multa flamma, absque cutis scarificatione, sæpius statim dolorem amouit: oportet autem eam umbilicum comprehendere. Quod si etiam tum dolores permanserint, medicamentis ex opio uti non dubitabis, quale est Philonis Tarsensis omnibus medicis notum. Tamen si scieris aliquam noxam ex huiusmodi medicamentis membris patientibus necessariò affuturam: nihilominus ad id quod magis urget instandum, & parua cum noxa hominem ex nimio dolore animo deficientem liberandum. Nam & sequentibus deinceps diebus

noxam

¶ In im-
pres. est
ωμολι-
γωρ. in
anti. autē
hæc vox
non habe-
tur.

noxam membro contractam, emendare licebit. Vocantur igitur huiusmodi medicamenta, anodyna, quoniam dolorem quidem sedant, & dolorem auferunt: non tamen dispositiones penitus sanant, sed vim sentiendi obtorpescere faciunt. Vti autem oportet Philonis medicamento omnibusq; ex opio confectis, non statim, sed post tempus compositionis annum, aut omnino semestrem. Maximè verò atque citissimè ex potu horum medicamentorum laborantes priuantur dolore, vbi intestina gracilia patiuntur, sicuti ex his quæ sedi imponuntur, crassorum intestinorum passiones præsentaneum habent remedium. Non modica autem sit virtutis distributio, † & † In Græc. ex ebibitis, quum superiora afficiuntur: *cod. imp̃s.* ex his quæ sedi imponuntur, quum inferiora fuerint affecta. *et in ant.* Quæ quidem in *ita habet* carnosissimis partibus spiritus flatuosi aggregatio, nonnunquam omnino vacat *tur κακ- τέρπινος* dolore, ac longiori tempore durat: ac tum *μύαν τοῖς.* præcipuè quum fuerint articulationi vicina: hic enim sunt musculi nervosiores ac densiores & carnosiores & rariores in media sui parte. Tales verò (vt nosti) passiones sanari medicamentis ex pice, resina, terebentina, & adipe leonino, atque

κατω πε- taurino. Conuenit autem ipsis & quod ex
 πονθοσι, sorde balnei & calce fit, & ex sycomoro, &
 κακτων (vt summam dicā) ea quæ insigniter sub-
 εντιθεμι- rili constant substantia, quibus ea quæ mol-
 ων τη liendi vim habent admiscuntur.

εδρα τοις

De abscessibus.

κα ανω

CAP. VI.

παρασιν. **Q**Uoniam de his satis diximus, iam tem-
 id est & pus est vt transeamus ad abscessuū
 ex exhibitis tractationem. Sic autem nomināt eas dispo-
 quū infe- sitiones in quibus à se inuicem distant quæ
 riores par prius se contingebant corpora. Spatiū igit-
 tes aff. ciū tur vacuū in medio fieri oportet, quod ali-
 tur, & ex quam substantiam spirituosam, aut humi-
 his q̄ sedi dam, aut mixtam ex vtrisque cōprehendat.
 iponūtur Transeunt autem in abscessum inflāmatio-
 quū supio nes quædam, atque erysipelatosæ phlegmo-
 res fuerit nes ac erysipelata phlegmonosa non pauca.
 affecta. Sine his verò, etiam abscessuum dispositio
 [Hoc est consistit ex multitudine quorundam hu-
 in Græ. morum, aut spirituum vaporosorum: siue
 impres. in in ipsis patientibus partibus [in medio] ge-
 ant. non nerentur, aut ex aliis confluant, ea ratione
 habetur. qua sunt illa quæ apostemmata vocantur.
 Nominant verò sic huiusmodi dispositio-
 nes, quum qui prius vnum membrū infesta-
 bant humores, eo relicto ad alterū trāsmu-
 tantur. Quocunque verò modo fiat absces-
 sus, id spatiū quod abscedentes interiacet
 partes

partes humiditatibus quæ ipsum faciunt cō-
pletur. Quæ vbi aliquando perdurauerint,
varias habent alterationes. Nam & lapidi-
bus, & arenis, & testis, & lignis atque car-
bonib⁹, & limo, & sordiciei balnei, & amur-
cæ, & feci, & multis aliis talibus similia in
abscessibus corpora, sæpe contineri inue-
niuntur. Quæ igitur per summa sub cute
consistunt, facile dignosci possunt: neq; est
eorū sanatio difficilis. Nam ex tactus pro-
prietate facillimè discernūtur. Curant verò
ex extrinsec⁹ adhibitis medicamētis neque
medicamētis intro assumptis indigēt, velu-
ti q̄ in p̄fundo & p̄sertim in viscerib⁹ fiūt.
Porro in dignotionibus, quum suppuran-
tur, † si non adeo manifestè quemadmodū † Legendū
inflammationes digitis incumbentibus reni- est si cedūt
tuntur, dignotionem igitur præbent mani- digitis p̄-
festam. Ac proprietas cessionis, alia est in mentibus
tenuibus humoribus, alia in crassis: quæ ad nō resistē-
modum & in tenacibus, atque muccis simi- tia quæ ad
libus. Sæpius verò nobis subiicitur cum ten modū mē-
tione spirituosa pars aliqua abscedēs, * quæ bra inflā-
vbi secta fuerit, inuenitur sanguis concre- mata.
tus: adeo vt qui bis aut ter huiusmodi repe * ἐὸς αἷος
rit dispositionem: si solers & memor fuerit, θίγτος.
comprehensum in huiusmodi tumoribus
sanguinem ita concretum agnoscere pote-
rit, quum in memoriam ex collatione re-

†Malè le- uocauerit , tensionis & † cessionis pro-
 gitur in prietatem. At forsan præstat non pro-
 impres. prietatem , sed quantitatem tensionis &
 †εως pro cessionis nominare. Curatio autem ea-
 †εως. rum quæ in superficie cutis abscedunt

inflammationum sit , incipiente quidem
 iam abscessu, per ea quæ dolorem sedant
 atque elaxant: procedente verò tempo-
 re, ad ea quæ concoquendi ac suppurandi
 vim habere dicuntur , transferri oportet.
 De his autem dictum est, sicuti de
 pluribus aliis, in quinto de medicamen-
 torum simplicium potestate tractatu. Sta-
 tim igitur aqua abundanti perfundere
 atque oleo calido partem inflammata
 conspergere , atque ex farina triticea,
 quæ in aqua atque oleo moderatè ebul-
 lierit , cataplasma imponere oportet.

: Nam hoc citius ad suppurationem per-
 ducit, quam id quod ex pane conficitur.

†δισκορη Illud enim† maximè dissoluendi vim ha-
 †ικωτα- bet, ut cui adsint sales atque fermentum
 †ον. i. ma- optimeque decoctum sit. Hæc verò o-
 ximè dis- mnia desunt triticeæ farinæ. Et quum
 cutiendi suppurari incipientem inflammationē cu-
 vim ha- raturus suppurationem prohibere posse
 bet. speraueris, tunc plurimum panem ebullire
 permittas, oleo scilicet & aqua permiscens:

fit

sit autem aqua ad oleū multiplex propor-
 tio. Plus autem & hoc suppurationem pro-
 hibet hordeacea farina, simili modo præpa-
 rata. Quæ verò in tali curatione infundi-
 tur aqua, habeat altheæ radices intus deco-
 ctas. Si verò per summa cutis in parte inflā-
 mata tensio valida fuerit, multis scarifica-
 tionibus in superficie† incidere oportet, ac †οχδρρ.
 postmodū ex farina hordeacea elixata, vt i. scarifica
 diximus, cataplasma apponere. Tētaui au- re, vide
 tē sæpius* plurimas, in superficie scarifica- que anno
 tiones, cōtrario autem ipsis modo per pro- tauimus
 fundum alias magnas, & tertias item quæ supra in
 medium tenebant in longitudine ac pro- ca. 2. pag.
 funditate inter has dictas. Quæ igitur in 47.
 superficie fiebant, debile auxilium affere *Ita legi.
 bant, quæ verò longæ erant atque profun in ant. ha
 dæ, plurimum quidem sanguinis exhau. bet enim
 riebant adeo vt ferè animi defectum af- πδνυπολ
 ferent. Rursus verò ipsæ propriam cura- λδρ in im
 tionem, veluti vulnera exigebant. Quæ pressis an
 autem earum ambarum medium tene. iē est πδ-
 bant, semper inueni à prædictis incon- υλππτδρ
 uenientibus esse remotas: atque ideo id est val
 eas in vsu censui aliis esse præferendas. de ienues.
 In quibus igitur difficulter ad suppuratio-
 nem peruenit, neque facilè discuti tumor
 potest, ibi humores esse compactos crassio-
 res ac tenaciores est existimandum. In his
 vero

verò dispositionibus tantum, conuenit ea quæ fit per profundiores scarificationes curatio. Conuenit etiam id quod ex caricis constat decoctis cataplasma, oportet autem non ipsas assumere caricas, sed aquam in qua ebullientes sunt liquefactæ. Expediit verò & caricas pingues esse & dulces, ut earum humor non dissimilis melli videatur. Et si eas assumens decoxeris usque ad plurimum temporis reddetur aqua melli tenui substantia simillima. Huic igitur aquæ aliquando hordeaceam farinam iniicere oportet, aliquando panem syncomistum. Sic autem nominant eum qui medius inter exquisitæ purum & furfuraceum. Vocant autem nonnulli eundem panem autopyron, quoniam in puro farinam non qualis natura est, talem ad conficiendum panem assumunt, sed prius purgantes furfur excernunt, contra autem in furfuraceo, prius adimunt eam farinæ partem quæ purissima est. Panis autem qui autopyros appellatur, qualem habet ex natura farinam triticum, talem etiam seruat. Oportet autem triticum ipsum ex quo farina sumitur, esse ex his quæ generosa dicuntur. Quædam enim ex ipsis triticis multum in seipsis furfuris continent, quæ ignobilia dicunt, quædam verò siliginem: quæ

ut

vt dixi, generosa vocant. Nequaquam igitur oportet furfuraceum esse frumentum, ex quo utilem ad cataplasmata farinam accipimus, sed quemadmodum dictum est, multam habere filiginem. Quod si ignobile triticum assumpseris, crassior rem furfuris partē oportet excernere, atque ita panem medium conficere. Ex hoc igitur pane, partem mediam ac teneram ad cataplasmata commiscebis: quando, vt dixi, potentia mediū farinæ hordeaceæ & triticeæ volueris facere cataplasma. Nam farina triticea maximè ad suppurationem mouet, hordeacea verò plurimū resoluit. Hic verò quem diximus panis mediam naturam seruat, sicuti & eius farina, inter nuper dictas farinas triticeas est media. Ad hoc igitur respiciens, cum decoctione caricarum, misce quod tibi conuenientius videbitur, siue ex panibus, siue ex farinis. Si verò tumor resoluatur, minus tamē quā oportet, simul coquere oportet cum caricis hyssopum, vel origanum. Si quando verò vehementius tumorem exiccare volueris, sal decoctioni adicias, deinde hoc modo infunde farinam hordeaceam. Eximatur autē & hinc quicquid furfuraceū inest. & postquā plurimum ebullierit, appone cataplasma. In tumoribus quidem qui difficulter

culter resoluuntur, verendum est ne eorum reliquæ scirrosæ relinquantur, quare in singulis solutionibus attendere oportet, ad quid transmutetur omnis cuius curatio suscipitur, tumor. Nam ea quæ cum fortiter exiccantibus agitur, reliquias scirrhas operatur. Hoc verò in singulis solutionibus animaduertes, si partem patientem tetigeris, & quod nunc apparet, illi quod prius videbatur contuleris. Si igitur unquā tale suspicatus fueris, decoque in aqua cucumeris agrestis radicem aut brioniæ, aut asari, sæpius quidem per se solas, nonnunquam caricas pingues adiiciens. Deinde aquæ farinam admisce, cōmiscens & aliquid adipis anserini præcipuè vel gallinacei, quod si nō affuerint, suillum adiunges. Radices quoque earum quas nuper diximus herbarum, atq; præterea altheæ, si post moderatam decoctionem cum pane atq; adipe conterantur, huiusmodi tumores resoluūt, fortior autem hisce omnibus est dracontij radix, & si quando ea vti volueris, quum sit his quas nuper diximus multo subtilior, atque ad resoluendum potentior, omnino adipem commisce. nisi enim humectaueris atq; mollieris scirrhos, sed cū fortibus medicamentis resolvere tantum studueris, in primis quidem diebus eos insigniter de-
cresce

crefcere facies, fed pariter id quod relinqui-
tur indurabis, hoc verò induratum difficul-
ter refoluetur. Melius igitur, vt diximus,
fortiter refoluentibus medicamentis com-
miscere mollientia, ne tumores in fcirrhus
(quorum curationem in præcedentibus au-
diuifti) conuertantur, verentes.

De tumore fuppurato. CAP. VII.

Rurfus igitur ad fuppuratos tumores
accedamus, quos vbi poffe refoluere
desperaueris, ex farina triticea vttere cata-
plafmatibus. Nã ad celeritatem fuppu-
rationis plurimum conferunt. Deinde ape-
riens, fi videris ea quæ circa fectionem funt,
libera inflammatione, medicamentis quæ
emplaftica dicuntur vttere. Efto autem eo-
rum vis ad exiccandum habilis, careant
etiam morfu, neque astringentia medica-
menta habeant admixta, fed ea potius quæ
fine moleftia folum refoluunt, vel parum
aliquid astringentis habeant facultatis.
Ego verò fapius in huiusmodi, vfus fum
medicamento ex fermento & oſtreis com-
buſtis confecto, fi verò pars aliqua circa
fectionem inflammata fuerit, id quod ex
chalcite conſtat oleo liquefaciens: vbi ve-
rò paulatim refrigeratũ fuerit, in mortario
temperans & molliens manibus, atq; vinũ
infundens, vt noſti. Ad multa verò vtilẽ
eſt

est hoc medicamentū, quē admodum in li-
 † Hic græ. bris de cōpositione pharmacorū diximus.
 cod. īpres- Faciemus etiam alios, si deus voluerit, de
 si sunt mē passionibus quæ singulis partibus accidūt,
 dosi: ha- vbi omnium medicamentorum quibus vti
 bēt enim consueui, diligenter vires explicare tenta-
 τῇ καλου- bo, atq; eorum vsum opportunum expone-
 μένῃ κατὰ re. Sed tu iam in hisce medicamentis, de qui-
 πλάσμα- bus in hoc libro memini, habuisti à me an-
 τος ἀγο- tea & mensuras, & præparandi modum, vbi
 γῆ θερὰ- verò plus opportuno cutis coliquata fuerit
 πύεθαι in suppuratationibus adeo vt panno lacero si-
 τὸ ἕλκος. milis efficiatur: non facilè subiectis corpo-
 i. per ap- ribus agglutinatur, ita vt necesse sit † eum
 pellatā ca qui sine, cataplasma nominatur curationis
 taplasma modum adhibere.

tis rationē

De sinu.

CAP. VIII.

vlcus cu-

rare. Sed

in codi.

manuscri

ptis quos

vidimus

legitur nō

καταπλά

σματος.

Sed κατὰ

πλάτος.

Quòd qui

QUum verò amplius agglutinandi cu-
 tem subiectis corporibus creuerit
 difficultas (huiusmodi affectum sinū appel-
 lant) deinceps tibi in memoriam reuocabo,
 huius quoque curationis modum, quem vi-
 disti me sæpius in pluribus adhibere. Vbi ta-
 lis dispositio consistit, satius est fistulā di-
 rectè perforatam, vel ex ære velex cornu
 factam habere paratam, quod si hæc non
 fuerit, vnum ex his instrumentis quæ pyul-
 ca, id est puris attractiva, dicuntur, quod
 foramen latissimum habeat. Et eius quod

ἀνο

à nobis compositum est ex charta combu- *da vertūt.*
 sta medicamentum, tu sæpe vidisti me exi *Itaq; emis*
 guam portionem multo oleo rosaceo per- *sario lar-*
 miscere, ac per id instrumentum quod pus *giore fa-*
 attrahit in sinus iniicere, deinde linamento *cto vlcus*
 cōcerto os claudere. Quæcunq; verò em- *necessario*
 plastica medicamenta oleo rosaceo liquefa *curādum*
 cientes his iniicimus, pyulcon nō permeāt. *est. De hoc*
 Sed in his oportet vesicam suillam accipiē *vide no-*
 tes, fistulam directum foramen habentem *stras an-*
 apponere. Esse verò acriora medicamenta *notatiōes.*
 liquefacta, quam illa quæ emmota: id est
 quæ linamentis illinuntur, est necessarium,
 qualia sunt apud omnes vsitata, colore vi-
 ridi insignia, hæc enim oportet non pau-
 co oleo rosaceo liquefacere, vt in sinum
 iniici possint, dissoluitur autem emmoto-
 rum vis in huiusmodi mixtionibus. Igitur
 emplastica omnino medicamēta, quale est
 Machæarionis, & Epigoni, & quod Isis co-
 gnominatur, vbi ad emmotorum vsum de-
 ducuntur, cerati indigent admixtione, nem-
 pe hæc ad sinus vtilia sunt, qua enim ratio-
 ne eis ceratum admiscetur, eadem etiam
 sunt ad sinus vtilia. Miscentur autem, quo-
 niam vires mordaces habent, si per se so-
 la liquefcerent, non admixto ipsis cera-
 ro. Sed vbi quidem oleum rosaceum plu-
 rimum fuerit, quod in ipso liquefcit me-

H

dicamentum paucum, non amplius acritudinem seruat. Vbi verò sinus mediocriter carne oppletus fuerit, tunc agglutinantia medicamenta apponere oportet, veluti si recenti & sanguinolento vulnere medicare ris. Multa verò talisunt natura prædita, quæ partim ex asphalto constant, vocant autem huiusmodi nescio quo modo emplastrum *barbara*. Alia verò sunt quæ *†* *cirrhotæ* ex colore dicuntur, ex lithargyrio & æruginæ aris decocta plurimum, sic enim ærugo *cirrhum* colorem accipit. Si verò paucum ebulliat, facit emplastrum quæ lutea dicuntur. Te verò non latet quod omnia metallica medicamenta subtiliorum partium sunt, atque exiccandi vim maiorem habent, ubi plusculum ebullierint. His verò medicamentis simul atque ruffa sunt repositis, quædam extrinsecus supereminetia fusca concrevit, sub qua pars medicamenti profundior, plusquam ab initio ruffor videtur. Atque idcirco nonnulli huiusmodi emplastrum vocant bicolora, quidam verò bifacia. Quanto verò subtiliora fuerint, ac maiorem exiccandi vim habuerint, tanto plus in sinum operabuntur. Nā ad eius profundum oportet transmitti vim, si intentionem propositam assequi velimus. Quæ verò recentia & sanguinea vulnera agglutinant,

† In gre.
est κίρρα
ἢ φαιά .i.
flava vel
fusca.

tinant, quanquam his minus exiccant, labra vulnerum, si brevia extiterint ac minimè profunda, agglutinant, atque ob hoc facile ac citò quod oportet efficiunt. Si verò in profundum vulnus recens protendatur, & futuris & fibulis solemus ipsa coniungere. Sinus itaque omnes non simplices sunt diuisiones, sed frequenter in ipsis, modò vna pars, modò alia excoriata est, quod neque te oportet latere. Quum igitur ad locum superiorem sinus extenditur, facile per os humor vitiatu elabatur. Si verò vergit ad ima, quum intus retineatur, partem aliquam continuam erodit. In his quidem sinibus, nisi prius ad effluxum feceris sectionem, nihil proficies: neq; quum carnem generare, neque quum agglutinare volueris. In aliis verò non opus est sectione, si modo conuenientem figuram in parte patiente seruaueris, ex qua figura potes aliquando sinum ad partem superiorem vergentem facere ad inferiorem declinare; ac contra, vergentem ad ima, conuertere ad superiora. Vidisti me igitur sinum in brachio existentem, cuius os erat prope cubitum figura in superiora tédente, sanasse sine alia facta ex aduerso sectione: & in coxa similiter figura sinus ad ima vergente, quum sinus versus genu quidè terminaret, altius

verò os media coxæ regione superius, si-
ne vlla ex aduerso diuisione similiter vi-
disti factam esse curationem, subiiciente
me popliti cervical molle, vt inferiorem
situm haberet inguen quam genu. Suffe-
cit autem in hoc sinu, & aliis isto maiori-
bus, solum mellicratum immissum, aptum
ad conglutinandũ omnes eius partes pro-
fundiores. Quidam autem lixiuium per-
colatum iniecerunt, seipsos coarguentes
in his, quæ prius ad carnem sinui inducen-
dam medicamēta apposuerunt, neque enim
caro noua adnasci potest, quum sordicies
priorem circumsedit. Quomodo igitur
sufficienter carne innata sinui congluti-
natiuum adhibent medicamentum? siqui-
dem veluti satis sordidum existentem li-
xiuio abstergere tentant, quum pura caro
neque acrius mellicratum toleret. In

† *ix* *ᾠρ* hoc igitur satis est, si hoc tale immitta-
id est sa- tur, quale quispiam cum voluptate pota-
niem. ret: & post mellicratum solitus sum de-

* In *græ.* incept, antequam medicamentum con-
legitur, in glutinatum imponam, aliquando vino
ter dulce solo, aliquando vino mulso sinum ablue-
e auste- re. Nam ad abstergendum atque ad
rū mediū expurgandum † circumstantes humores vi-
locū obli- tiatos mellicratū est melius, sed ad cōgluti-
neat. nandum, vinum est melius & efficacius: * sit

autem

* In ant. est non μόνος, sed ἢ οἶνός, id est, vel ex vino.

† μαλακός ὡς αἰμάλιος, id est mollis quam maximè licet.

* In græco ita legitur, linteorum verò circumuolutiones constringantur quidem in fundo sinus, sed non ita ut dolorem inferant, paulatim autem laxentur vsque ad os sinus.

* In cod.

autem quod habeat dulcedinem & vim impres. le-
astringendi mediocrem. Et quidem post gitur in i-
medicamenti agglutinantis appositionem δοσις, id
spongia noua ex mulso * sola circumuoluta est, addi-
tur † quam molliter fieri potest, atque al- tamentū,
ligatio quidem incipiat à fundo sinus, si in anti-
niat, autem ad os, * sed nec linteorum cir- quo verò
cumuolutiones ad fundum sinus dolore af- in δόσις,
ficient, sed cōstringantur paulatim atque & ita
soluantur vsque ad os sinus, & hoc ipsum vertit in-
habeat laxam pharmaci * alligationem, & terpres,
quod circum apponitur emplastro ita cum & in a-
forficibus discissio ut ex ore sinus humores lio anti-
vitiati † si qui excernantur, possint efflue- est in i-
re, paruo aliquo alio ipsi imposito empla- θεσις, id
stro vsque ad solutionem, quam tertia die est apposi-
faciens, auferes hoc ipsum, quod veluti tionem.

† Ita ha-
bent Gra-

ci cod. antiqui quos sequitur interpres, Aldinum autem
esse mendosum hoc in loco, indicat etiam editio Blasii, in
qua legitur sicuti in antiquis.

suprapositum circumiacet, id quod per totum sinum circumiectum est medicamentum relinquens. Indicium autem tibi sit, nunquid pars sinus profunda sit bene cōglutinata, humor emanans si multus, aut paucus, decoctus, aut crudus. Adhuc autem si neque in ipso sinu dolor sentiatur, neque tumor appareat, sed totus locus depressus siccus atque expers doloris existat: si autē

† In im- & pus impactum in ore videris paucū, ad-
pres. est iu huc magis bona tibi sit spes de sinus con-
πρεπτον. glutinatione, imponensque rursus spongiā
i. bene co- ac denuò alligans vt diximus, secunda die
Etum. in vel tertia solue, permutās semper quod ori
ant. iu πο sinus superstat linteum eodem emplastro
πον. perunctum, quod totum os in circuitu com-
prehendet. Oportet autem non esse admo-
dum compressum, sed ita vt omnis humor
vitiatus ex sinu per ipsum possit euacuari.
in prima igitur & secunda die si aliquis hu-
mor tenuis à sinu excernitur, noli omnino
de cōglutinatione desperare. Sæpius enim
circumpositi membro patienti vis medica-
menti vehementer exprimit ex ipsa cute &
carne subiecta tenuem humiditatem, quan-
do ita affectum fuerit corpus ægroti, aut
ex naturali temperatura, aut ex malo victu,
qua humiditate expressa, spatia mediocri-

ter

ter exiccata conglutinantur. In tertio au-
tem & quarto ab initio die si humor cru-
dus in ore se ostenderit, tunc scito sinum
non esse conglutinatum. Sit autem præ o-
mnibus id quod patienti membro circumfi-
citur medicamentum, vehementer quidem
exiccans, neque mordens verò, neque in-
tendens, veluti est nostrum quod cirrhum
vocatur, sine cera confectum ex metallicis
medicamentis elixatis & oleo cicino & ace-
ro, quod vulnera sanguinolenta congluti-
nat ac sine molestia sinus exiccat. Vidisti
verò & ipso sanatam fistulam aliquando in
quibus angusto & existente foramine, quum † *In ant. le*
nondum intus callum haberent, sed sordi- *gitur. ä-*
ciem solum, immisi primum lixiuum, dein *μα καὶ μα*
de tandiu intus permanere permisi, donec *κράς. i. si-*
speraui totam sordiciem penitus excidis- *mul & lö*
se: post modum medicamentum apposui. *go.*
Si verò & eos qui sub cute sunt sola sinus,
in quibus nondum carnem generari opor-
teat, quique ruditer à quibusdam cura-
ti erant, † facta simul susceptione hoc † *In gra.*
medicamento conglutinaui, quum tamen est *äμα-*
prius lixiuo abluissem. Quoniam qui vl- *τῷ παρα*
cera curant, nullum ex his, quæ expurgan- *λαβίρ. i.*
di vim habent, adhibent medicamentum. *simul atq;*
Vbi verò qui ad abscessum perueniunt, tu- *suscepi.*
mores tardè secti fuerint, aut ob medicatiū

imperitiam, aut eorum quibus medela adhi-
 betur timiditatē, qui secari non patiuntur,
 sed expectant vt longiori tempore cutis à
 pure rodatur: contingit sæpius vniuersam
 cutim à pure circa abscessum aggregato
 sufficienter extenuari instar laceræ vestis,
 unde & illi nomen* lacerosi à medicis indi-
 tum puto. Est itaque huiusmodi cutis con-
 glutinari contumax, præcipuè si quis secun-
 dum substantiam siccum medicamentū im-
 ponat, ex his enim magis fit laceræ vesti si-
 milis, & sicca cutis instar pellium detrita-
 rum. Visum est igitur mihi opportunum, si
 quis ad eius conglutinationem vtatur me-
 dicamento, substantia quidem humido, po-
 tentia autem sicco. Dictum autem in libris
 de medicamentis quod potentia sicca me-
 dicamenta dici solent, à medicis quæ exic-
 candi vim habent. Optimum autem ex o-
 mnibus medicamentis quæ substantiā qui-
 dem humidam habent, vim autem exiccand-
 i, est id quod à me compositum est ex li-
 thargyriō & adipe suillo antiquo & chal-
 cite, quibus additum sit oleum vetustissi-
 mum. Nam vim eius esse efficaciorē suam
 expertus ad huiusmodi dispositiones, quū
 neque admodum durum fuerit, neque ex-
 quisitè non inficiens. sed si tale cōficiatur
 & vulnerum sanguine manantium conglu-
 ti

†καθάρ

περ τερα

κος.

*ρακώδες

†ἀμβλυ-

7ον. est in

græc.

tinatium erit, & omnia etiam vlcera ad ci-
 catricem perducit, si & oleo remittatur, &
 cum vino mediocris ætatis commisceatur,
 deinde in circuitu eiusmodi dispositioni-
 bus apponatur, ipsas sæpius sine vlla mole-
 stia conglutinavit. Confert autem, vt di-
 ximus, in lacerosis cutibus non minus mel, si
 vsque ad emplastri consistentiam elixetur.
 Eius verò elixationis mediocritas vix re-
 ctè perficitur, nisi inspiciatur: oportet enim
 ipsum neque adeo esse durum vt†difficul- † δυσπε-
 ter lambatur, neque ita humidum vt circun πτωτον
 fluat. Nam quod durum est, ad eādem per- est in gra-
 uenit cum duris emplastris absurditatem: i. difficul-
 humidum verò veluti superiectum calido ter prola-
 corpori vndique circumfluit, & siccum lin- batur. su-
 teum derelinquit, quod non modò nihil iu it autē is
 uat, sed etiam nonnunquam obest cuti, quæ typogra-
 debet cōglutinari. At si mediocriter elixe- phi lap-
 tur, hoc quidem optimum est medicamen. sus: tamen
 tum in huiusmodi sinibus, sed quoniam eli- non desue-
 xationis eius mediocritas non facilè potest runt qui
 coniectura attingi, rectius mihi visum est hoc in lo-
 ei myrrham * subtiliter tritam aspergere, co vertat:
 aut aloë vel thus, aut aliquod ex his, vel vt diffi-
 omnia simul, tum præcipuè quū linteo in- culter po-
 unctum humidius apparet. Oportet autem tabile fiat
 aspergere ista per cribrum quod sublimè * χυαίνον
 supra mel tepeatur. sufficit autem semel aut

H s

† *λεαζω-* bis agitare, vt mediocriter excidat. Sæpius
 † *Est in* verò & dum elixatur adiicio melli aliquid
 † *græ. i. leui* ex antedictis medicamentis, quando præ-
 † *gari.* fertim sinus maior fuerit atque profundior
 Vfus sum aliquando & tenui centaureo,
 quod mirum est ad huiusmodi medicamen-
 tum. Post ipsum verò & symphytum vtile
 est, & deinde ireos illyricæ radix, postea fa-
 rina ex orobis: neque obscurum est quin &
 contundi oporteat, & per cribrum subtile
 transmitti, ac postmodum † resolui talia o-
 mnia. melli autem commisceantur eo tem-
 pore quando debet ab igne amoueri, tan-
 tum nobis super terētibus donec melli de-
 cocto optimè vniantur. Melius autem fue-
 rit si cacabum ab igne amouentes hæc omni
 admisceantur, & deinde diligenter agite-
 mus, donec mel adeo tepidum reddatur, vt
 corpori cui curatio adhibeatur, possit im-
 poni.

De gangrana.

Cap. IX.

Consequens est vt deinceps dicamus
 de inflammationibus, quæ gangrænæ
 factæ sunt. Nominant autem (vt nosti) gan-
 grænas eas, quæ ex magnitudine inflamma-
 tionis fiunt mortificationes, quæ nondū ta-
 men integræ factæ sunt. Nam quum omnino
 membrum effectū est emortuū vt punctū,
 vel

vel sectum vel adustum non sentiat, quæ patitur, statim recidere oportet, qua sanam partem vicinam attingit: sed quod ita affectum est denigratur: quod verò in medio est constitutum, vt tendat ita ad mortem gangræna nominatur. Curatur autem euacuantibus nobis quam possumus multum sanguinis, qui in membro patiente compingitur, cuius causa fiunt mortificationes, ob id quod arteriæ ex angustia loci nequeunt se attollere, reliquo autem transpirationes, exhibentibus. Aut igitur cutem vniuersam multis sectionibus profundis secare oportet vna cum subiecta substantia, aut plurimis scarificationibus profundis incidere, sanguinem verò quum manare permiseris, imponere debes ex medicamentis aliquod ad putrescentia vtilibus, cuiusmodi est † farina orobi vel lolij. Si verò ^{† In gra.} talia non adsint, fabarum farinam adhibe, ^{additur} atque ipsum oxymel solum: & si fortius ^{δι οξύμι-} medicamen apponere velis, adice sal, aut ^{λιτος καὶ} ex trochiscis aliquem exquisitissimè tritū, ^{.i. ex oxy-} qualis Andronis & Polyidæ, & Pasionis ^{melite, &} est, & Musæ medicamen ad hæc aptissimum, quod in Heræ tomo scriptum est. Vtor, autem ex his quæ antea diximus, animu aduertens ad corpus ægroti: nam si rusticum fuerit & durum natura, fortissima

me

medicamenta desiderat, foemineum verò
 & molles carnes habens, imbecilliora: sic &
 viri quicunque & molles carnes habent, &
 balneas amant, & in otio degunt, mollia exi-
 gunt medicamenta. Neque dubium est idē
 in pueris faciendum esse. Et si quando etiā
 putrefactam atque emortuam partem absci-
 deris, vt securius agas, his vttere medica-
 mentis, naturam corporum simul attendēs,
 atque eius insuper partis quæ malè affecta
 est. Quædam enim sunt, quæ citissimè ad
 putredinem veniunt, & satius est ob maio-
 rem securitatem, quando abscindis aut cir-
 cūcidis id quod iam putruit, eam quæ velu-
 ti quædam radix est, sanæ parti adiunctam
 adurere, sicuti sapius in pudendis facere cō-
 sueuimus, nonnunquam malè affectis par-
 tibus, quæ adurunt afferentes. quandoque
 verò & linamentum ante submittens: facta
 verò adustione solemus (vt nosti) vt i succo
 porri, qui vbi non adsit, his quæ paulò an-
 tē diximus. * Vbi verò tibi videbitur his
 remediis adhibitis cessare putredo, vt citò
 frustra excidat medicamento quod nomi-
 natur Cephalicum cum melle vttere. Me-
 lius verò & ex hydreleo pane decocto,
 vel farina hordeacea, vel etiam triticea fa-
 cere cataplasma: id etiam medicamentum
 quod Tetrapharmacum nominatur, ac pre-
 terea

tereà Macedonicum, sunt crustarum suppu-
 rationibus, atque earum excidentis accom-
 modatissima. Similiter autem & quæcunq;
 vim habent ad suppurationem perducendi,
 & panis verò tritus cū apio vel ocymo opti-
 mē crustas disrumpit, & à sanis partibus se-
 parat. Ex simplicibus autem medicamentis
 iris, vel radix panacis, vel aristolochiæ, vel
 acori cum melle. In mollibus verò corpo-
 ribus sufficit orobi farina cū melle vel thu-
 re. Aufert autem & crustas Machæionis
 medicamentum, & iris cum melle. Quum **In impf.*
 verò exciderint crustæ, huiusmodi vlcera *est à iōis*
 possunt quibuscunque medicamentis, quæ *ἐμμοτα.*
 carnem inducant, ad sanitatem perducī. *quæ lectio*

De cancris.

Cap. X.

in Aldino
notatur
tanquam

Quam de his abundè dictum sit, reli- *corrupta. i.*
 quum est vt de carcinosis tumori- *ant. autē*
 bus differamus, qui in omnibus quidē par- *legitur*
 tibus corporis fieri consueuerunt, sed in ma- *iōis μετὰ*
 millis præsertim mulierum, quæ à natura *μάλιστα. i.*
 purgationem non habent, quæ vbi modum *isis cum*
 seruauerint, tunc mulier integra fruitur sa- *melle. in*
 nitate. Hi verò omnes tumores ex atra bi- *alio ant. i.*
 lis superfluitate generantur. de qua dixi- *ἱεὶς μετὰ*
 mus in commentariis, in quibus de poten- *μάλιστα*
 tū naturalibus egimus, vbi ostendimus
 hunc

hunc humorem, dum sanguis in hepate fit, fecis vinariæ proportionē generari. expurgari autem à splene, qui ex eo naturaliter habet alimentum. Quum igitur naturalis temperatura hunc humorem paucum generauerit, & ratio victus adhibita confert, & splen satis attrahit ex eo qui generatur, nulla huiusmodi superfluitas in venis coacer-

Ita ha- uatur. † At quum vel omnia vel aliqua eue-
bent ant. niunt in contrarium, tunc in venis multipli
cod. in im catur, & eas de quibus dicturi sumus, facit
pres. autē ægritudines. Dico autem his quæ antea ex-
legitur & posuimus contraria, vt scilicet hepar ad ge-
tan di t a nerandum huiusmodi superfluitatem fit
vāvria i aptum. Sit etiam ratio victus per tales adhi-
i. quū ve. bita cibos, qui crassum & feculentum hu-
rō contra- morem procreare natura apti sunt, splen
ria eue- verò sit natura imbecillior, & quicquid de
niunt. ea superfluitate generatur, ad se minimè
* In ant. trahere potens. In hoc verò * corpore tur-
legitur. bidus fit, ac crassescit is qui in venis conti-
voσήματα netur sanguis, & nonnunquam à venis ha-
i morbo. bentibus (sicut & alia omnia) vim excernendi id quod extraneum est, per hæmorrhoidas excernitur. Sæpius autem & ad varices decumbit, & quandoque ad cutem vniuersam expellitur, fitque is morbus quem Elephantem nominant: nam & aliquando ad alias corporis partes, quæ cæteris sunt imbe-

imbecilliores, humor iste deferitur, atque
 euidenter apparent quæ in illa parte sunt,
 venæ, nigro sanguine ac crasso plenæ, quan-
 toque crassior fuerit ac nigrior, tanto de-
 terior est passio. In mamillis autem sæpe
 vidimus tumorem forma ac figura cancro
 animali consimilem. Nam quemadmodum
 in isto pedes ex vtraque parte sunt corpo-
 ris, ita in hoc morbo venæ distenduntur
 ac figuram omnino similem cancro repræ-
 sentant. hunc morbum per sui initia sæpe
 sanauimus. Sed vbi in molem insignem sa-
 tis attollitur, nemo sine manus opere po-
 tuit curare. Itaque in omni huius generis
 curatione intentio est, totum qui circun-
 stat tumorem præter naturam, qua parti-
 bus sanis adhæret abscindere, sed ob va-
 forum magnitudinē, quū præsertim fuerint
 arteriæ, profluuij sanguinis statim periculū
 imminet: quod si laqueis eas circūprehēdas
 & passiones insequuntur: si autē & morbi ra-
 dices exurere statuas, neq; huic rei maximū
 periculum deest, quū prope loca mortalia
 fit insignis adustio. Hunc igitur morbum
 (vt diximus) in principio sæpe sanauimus,
 & tūc præsertim quū atræ bilis humor ad-
 modum crassius videbatur existere. Nā sic † In græ.
 purgātibus medicamētis, ex quibus sanitas est † τος. in
 sequi hic.

sequitur, promptè succumbit, neque obscu-
rum est huiusmodi medicamēta debere es-
se euacuandæ atræ bili accōmodata. Quod
tandiu faciendum est, donec sanitas pristi-
na subsequatur, & ratio victus optimos ge-
nerans humores, interim adhibeatur. In
Alexandria quidem elephantis morbo plu-
rimi corripuntur propter victus modum &
regionis feruorem. At in Germania & My-
sia rarissima hæc passio videtur, & apud
Scythas lactis potatores nunquam ferè ap-
paruit. In Alexandria verò plurimum gene-
ratur ex victus ratione. Comedunt enim

†ἀβάρ. †farinam elixatam & lentem, & cochleas,
& plura salita, & nonnulli ex ipsis carnes asi-
ninas, & alia quædam quæ crassum & atræ
bilis humorem generāt. Nam quum circun-
stans aër calidus sit, motus humorum agi-
tur versus cutem. Huic igitur morbo, quas
antea diximus cōferūt purgationes. Quod
si & ætas & virtus permiserint, sanguis
prius mittendus est. In cancris verò nō in-
utile est, neque in istis vbi nihil prohibet
sanguinem mittere, demum purgare: & si
fuerint mulieres, menstrua euocare, si qui-
dem nondum quinquagesimum annum at-
tigerint. Patienti autem particulæ succus
solani imponatur, nam hoc medicamen ad
huiusmodi vtile est. Quod si nolit agros-
tans

tans medicamento adeo humido illiniri, quum præsertim domo exit ad consueta negocia peragenda, medicamen ex pompholyge constans est imponendum, quo me vidisti uti ad caneros exulceratos: & si hoc non adsit, adhibe alterum medicamentum nostrum quod ex chalcite fit. In victus vero ratione succus ptisanæ abundanter exhibendus, & serum lactis, & ex oleribus, malua, atriplex & bletū, & quando tēpus tulerit cucurbitis ut edū, & piscibus petrosīs, & avibus omnibus, exceptis palustribus.

De Elephantia. CAP. XI.

Sed his qui elephantiam patiuntur, in viperarum esu est mirabile † auxilium. † Βοήθη-
Ita vero eas condire oportet quemadmo- μα est in
dum vidisti Marfos qui feris venenatis & anti. in
aspidibus nutriuntur: capite quidem pri- impres.
mum abscisso, & cauda, usque ad digitos φάρμα-
quatuor: deinde omnibus interaneis exem- κορ.
ptis, cute etiam † ut liquere potest ad em- † διλονδ-
pta, aqua deinde abluatur corpus ipsarum. τι. i. vide-
Sed neque aliter quum theriacum antido- licet.
tum conficere volumus, usque ad hoc præ-
paramus: sed deinceps concoquimus dif-
ferenter, in theriaca autē paululum anethi
& paucum salis in aqua ponentes. In his
autem qui elephantia si laborant, in olla
anguillarum modo præparantes, & album

ius efficientes, fit autem hoc modo. Aqua abundanter in ollam funditur paucū olei & cum hoc porrum & anethum adiicitur, liquet autem quod viperarū carnes sunt decoquendæ, donec exquisitè molles reddantur. Ipsum etiam medicamentū confectum ex viperis quod theriacam appellant, optimum est ac potandum iis qui huiusmodi morbo laborant, vel etiam si cui libuerit ad cutem oblinendam: nam quum omnia hæc facta fuerint, nonnunquam solet squama à cute decidere, aut quid simile ei, quod senium serpētis appellatur. In aliis autem tumoribus præter naturam non putavi oportere eam quæ manu fit curam hoc in loco scribendam, quum tu medicamenta proba-

† *ἡ δὲ κατὰ τὴν ὁδὸν* tiffima à nobis acceperis. In strumis enim *ἡ δὲ κατὰ τὴν ὁδὸν* ea quæ astringere & exiccare, & pus etiam *ἡ δὲ κατὰ τὴν ὁδὸν* facere possunt, in his autem quæ meliceri- *ἡ δὲ κατὰ τὴν ὁδὸν* quæadmo- des dicuntur, ea quæ has dissoluendi vim *ἡ δὲ κατὰ τὴν ὁδὸν* habent, & quæ pus resolvunt medicamen- *ἡ δὲ κατὰ τὴν ὁδὸν* ta, & aquam quæ in scroto & abdomine de- *ἡ δὲ κατὰ τὴν ὁδὸν* ter cutem cubuit, accepisti, † quibus etiam in aqua in- *ἡ δὲ κατὰ τὴν ὁδὸν* laboran- tercute laborantibus vtaris. In his enim du- *ἡ δὲ κατὰ τὴν ὁδὸν* tibus. plex intentio est, scilicet vt sanetur tumor *ἡ δὲ κατὰ τὴν ὁδὸν* [Hæc in durus in viscere, & coaceruata humiditas *ἡ δὲ κατὰ τὴν ὁδὸν* dissoluatur. At prius dictū est de curatio- *ἡ δὲ κατὰ τὴν ὁδὸν* ne viscerum scirrho laborantium: [sed dif- *ἡ δὲ κατὰ τὴν ὁδὸν* ferunt quum talem tumorem partes patiū- *ἡ δὲ κατὰ τὴν ὁδὸν* tur.

tur, & differentem exigunt curam.] Quare
 curatio hydropum ad has tres reducitur
 intentiones, vt sanemus durum tumorem
 qui in viscere est, vt ea apponamus quæ hu-
 miditatem dissoluunt, & medicamēta quæ
 vrinam mouent in potu demus. Hæc qui-
 dem ad te missa qui longè peregrinaturus
 eras, mediocriter se habere visa sunt. Si ve-
 rò (vt institui) librum de medicamētis se-
 cundum morbos & loca patientia compo-
 suero, illum in tuo reditu habebis. Sed &
 aliud opus magnum amicis ex postulatibus
 exarabitur, in quo tota ars curandi conti-
 netur, etiam si tibi peregrè detineri
 diutius contigerit, singulos qui
 a nobis scribentur com-
 mentarios ad te mit-
 tere non gra-
 uabimur.

*

*Quæ in fine huius libri de curatione poda-
 grici affectus in veterem translationem irrepse-
 rant: quoniā nō Galeni sed Alexandri Tralliani
 esse nouimus, consulto omisimus, in alijs autem
 locis multa quæ Galeni esse censemus, & in
 Græcis codicibus desiderantur, ex veteri ipsa ver-
 sione, vt licuit, restitimus.*

. I . 2

